



ปัญหาพิเศษ

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย

APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) IN THE STUDY OF BIODIVERSITY IN NATIONAL PARKS OF THAILAND

นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐ

สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2551



ใบรับรองปัญหาพิเศษ
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ปริญญา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขา

วิทยาศาสตร์
สายวิชา

เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย
Application of Geographic Information System (GIS) in the Study of
Biodiversity in National Park of Thailand

นามผู้วิจัย.....นางสาวพรณิศา สัตยารัฐ.....

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ประธานกรรมการ.....

(.....อาจารย์พุทธพร ส่องศรี.....)

สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองแล้ว

(.....อาจารย์ศลยา สุขสอาด.....)

หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ปัญหาพิเศษ

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย

**Application of Geographic Information System (GIS) in the Study of
Biodiversity in National Park of Thailand**

นางสาวพรณิศา สัตยารัฐ

สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ)

พ.ศ. 2551

พรรณนิศา สัตยารัฐ 2551: การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สายวิชาวิทยาศาสตร์ ปรธานกรรมการ
ที่ปรึกษา: อาจารย์พุทธพร ส่องศรี , D.Eng. 128 หน้า

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
อุทยานแห่งชาติของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพถ่าย
ดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาประยุกต์เพื่อนำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และนิเวศวิทยา ภายในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ของประเทศไทยมาวิเคราะห์ และจัดทำในรูป
ฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Google Earth version 4.0 โปรแกรม MS Excel และโปรแกรม
Photoshop CS3 ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วยความหลากหลายชนิดของพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช ที่พบภายใน
อุทยานแห่งชาติ และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติ จากการศึกษาอุทยานแห่งชาติ
ของประเทศไทยทั้งหมด 148 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 59 แห่ง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตกรวมกัน 25 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แห่ง และภาคใต้ 40 แห่ง ได้ข้อมูลสัตว์ป่า
ประมาณ 1,321 ชนิด และพันธุ์พืชประมาณ 1,451 ชนิด เพิ่มข้อมูลโปรแกรมที่ได้จากการศึกษาใน
ครั้งนี้สามารถนำไปใช้ป็นสื่อการศึกษาเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

ลายมือชื่อนิติติ

ลายมือชื่อประธานกรรมการ

Pannisa Sattayarat 2008: Application of Geographic information system (GIS) in the study of biodiversity in National Park of Thailand. Bachelor of Science (Biological Science), Major Field: Biological Science, Department of Science. Special Problems Advisor: Mr.Puttaporn Songsri , D.Eng. 128 pages.

Application of geographic information system (GIS) in the study of biodiversity in National Park of Thailand. The objectives of this study were to apply satellite imaging technology and geographic information system for analysing by computer program : Google Earth version 4.0, MS Excel and Photoshop CS3. The information from this study include plant and wild animal biodiversity in Thailand National Park. The results of this study found that there are 148 National Parks of Thailand (59 from Northern; 25 from Eastern, Western and Central; 24 from Northeastern and 40 National Parks from Southern Parts of Thailand). We get biodiversity informations about 1,321 species of wildlife and 1,451 species of plants. This database can be use in internet for web-based self study in ecology.

Student's signature

Advisor's signature

/ /

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พุทธพร ส่องศรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจแก้ไขรายงานปัญหาพิเศษฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และคอยให้กำลังใจมาโดยตลอด

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้กำลังใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

พรณิศา สัตยารัฐ

30 เมษายน 2551

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(1)
สารบัญภาพ	(2)
คำนำ	1
วัตถุประสงค์	2
การตรวจเอกสาร	
ระบบนิเวศบนบก	3
ระบบนิเวศชายฝั่ง	5
อุทยานแห่งชาติ	6
สัตว์ป่า	7
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	9
ความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)	12
อุปกรณ์และวิธีการ	
อุปกรณ์	22
วิธีการ	24
ผลและวิจารณ์	
ผล	34
วิจารณ์	122
สรุปและข้อเสนอแนะ	123
เอกสารและสิ่งอ้างอิง	126

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	หน้าแรกของโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)	13
2	โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)	14
3	งานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	15
4	งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	16
5	งานด้านธุรกิจคอนโด อพาร์ทเมนต์ให้เช่า	17
6	งานด้านธุรกิจประกัน	18
7	งานด้านธุรกิจสื่อสารมวลชน	19
8	งานด้านการเรียน การสอน	20
9	งานด้านงานป้องกันระวางภัย	21
10-11	การดาวน์โหลดโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)	25
12	การดาวน์โหลดโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)	26
13	วิธีแก้ไขระบบสำหรับภาษาไทย คือ ดาวน์โหลดไฟล์ที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ คลิกขวาแล้วเลือก Merge	26
14	การใส่ค่าตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด	27

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
15	การตั้งค่ารายละเอียดของการปักหมุด	28
16	การทำLink ไปที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ ด้วยคำสั่งhtml	29
17	การใส่รูปภาพต่างๆ และ กำหนดขนาดรูปภาพ ด้วยคำสั่ง html	29
18	การบันทึกไฟล์	30
19	การบันทึกไฟล์เป็น *.kmz	31
20	ภาพรวมของการปักหมุดอุทยานแห่งชาติ (ในมุมมองกว้าง)	35
21	ภาพรวมของการปักหมุดอุทยานแห่งชาติ (เจาะลึกบริเวณประเทศไทย)	36
22	ตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง	118
23	แสดงรายละเอียดของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง	118
24	เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ(อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)	119
25	แสดงการดับเบิลคลิกเพื่อลิงค์ข้อมูลสัตว์ป่า และพันธุ์พืช	119
26	แสดงข้อมูลของสัตว์ป่า(นกนางแอ่นตะโพกแดง)	120
27	แสดงข้อมูลของพันธุ์พืช(อินทนิล)	120

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน อุทยานแห่งชาติของประเทศไทย

Application of Geographic Information System (GIS) in the Study of Biodiversity in National Park of Thailand

คำนำ

ในสภาพการปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในด้าน hardware และ software รวมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การหาวิธีการ หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาภายในอุทยานแห่งชาติต่างๆของประเทศไทยมาวิเคราะห์ และจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูล ควรเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งสามารถที่จะนำเทคโนโลยีการสำรวจด้านต่างๆ เข้าผสมผสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic information system : GIS) เป็นเทคโนโลยีการสำรวจ คือ การสำรวจพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชภายในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย โดยมีการระบุพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม (Global positioning system : GPS) ซึ่งต้องสามารถนำเข้า จัดเก็บ เรียกค้น วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ ข้อดีอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ สามารถสร้างแบบจำลองทางพื้นที่ได้ โดยแสดงผลออกมาแล้วสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน ซึ่งโปรแกรม Google Earth เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของสถานที่ต่างๆในโลก สามารถถ่ายรูปจากมุมสูงที่มีความละเอียดสูงเหนือชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้เป็นเพราะความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติที่พัฒนาศาสตร์ องค์ความรู้ให้สามารถทำในสิ่งที่เหลือเชื่อได้ และเป็นที่เชื่อกันว่าเทคโนโลยีต่างๆจะมีการพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมที่ปรากฏใน Google Earth มีประโยชน์ในหลายด้าน ในที่นี้จะกล่าวถึงประโยชน์ทางด้านใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนสาขานิเวศวิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยวิชาเหล่านี้สามารถใช้ภาพจาก Google Earth ช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เพื่อศึกษาโปรแกรม Google Earth 4.0 ในการประยุกต์ด้วยการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา
3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และสื่อการศึกษาเรื่องอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

การตรวจเอกสาร

ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ทอดตัวอยู่ในแนวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างเส้นละติจูดที่ 97 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 45 ลิปดาตะวันออก และเส้นลองจิจูด 5 องศา 45 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 1,500 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ 500 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร (320.7 ล้านไร่)

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันหลากหลาย และสภาพภูมิอากาศเขตร้อน ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ประเทศไทยจึงมีถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติหลากหลายประเภท ซึ่งอาจแบ่งเป็นระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศน้ำจืดและระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล

1. ระบบนิเวศบนบก

ระบบนิเวศธรรมชาติบนบกของประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยป่าไม้ มีทุ่งหญ้าข้างเป็นส่วนน้อย ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าไม่ผลัดใบ (evergreen forest) และป่าผลัดใบ (deciduous forest) ป่าไม่ผลัดใบส่วนใหญ่มักพบในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนสูงและฤดูแล้งที่สั้น ดังเช่นบริเวณภูเขาและที่ลุ่มต่ำของภาคใต้ และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่สูงตอนบนของประเทศ ในขณะที่ป่าผลัดใบ โดยมากจะพบในพื้นที่ราบตอนกลางและตอนบนของประเทศ ทั้งนี้ป่าแต่ละประเภทสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศ ลักษณะดิน และปริมาณน้ำฝน ได้ดังนี้

1.1 ป่าดงดิบเขา

ป่าดงดิบเขา (hill evergreen forest) เป็นป่าไม่ผลัดใบ พบในพื้นที่ภูเขาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าดงดิบเขาในประเทศไทยมีอยู่ 3 ประเภท คือ ป่าดงดิบเขาระดับสูง (upper hill evergreen forest) ป่าดงดิบเขาระดับต่ำ (lower hill evergreen forest)

1.2 ป่าดงดิบแล้ง

ป่าดงดิบแล้ง (dry evergreen forest) เป็นป่าไม่ผลัดใบ พบได้ทั่วไปทางตอนกลางและตอนบนของประเทศ ในพื้นที่ต่ำกว่า 400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000-2,000 มิลลิเมตร ต่อปี และมีฤดูแล้งเป็นเวลานานอย่างน้อยที่สุดสามเดือน

1.3 ป่าดงดิบชื้น

ป่าดงดิบชื้น (moist evergreen forest) เป็นป่าไม่ผลัดใบ ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ที่ความสูงน้อยกว่า 900 เมตร เหนือ

1.4 ป่าสนเขา

ป่าสนเขา (pine forest) เป็นป่าไม่ผลัดใบ ป่าสนเขาธรรมชาติยังคงพบได้ในพื้นที่สูงบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูงประมาณ 800 -1,800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ป่าสนเขาที่พบในพื้นที่

1.5 ป่าเบญจพรรณ

ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) เป็นป่าผลัดใบ พบอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศสามฤดูกาลที่ชัดเจน มีช่วงแล้งนานกว่าสามเดือนและมีปริมาณฝนต่ำกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี ลักษณะป่าเป็นป่าโปร่งบนพื้นที่ที่มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์กว่าป่าเต็งรัง

1.6 ป่าเต็งรัง

ป่าเต็งรัง (dry deciduous forest) เป็นป่าผลัดใบ ส่วนใหญ่พบได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสูงประมาณ 100 -1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ปริมาณฝนน้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และมีฤดูแล้งยาวนาน ป่าเต็งรังเป็นป่าโปร่งคล้ายป่าผสมผลัดใบ

1.7 ป่าพรุ

ป่าพรุ (peat swamp forest) ขึ้นอยู่ในพื้นที่ลุ่มในแผ่นดินที่มีน้ำท่วมขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี ดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์วัตถุที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชเป็นเวลานาน ส่วนที่สลายหมดไปจะเกิดเป็นอินทรีย์วัตถุเรียกว่า muck ส่วนที่สลายไม่หมดเรียกว่า peat ในพื้นที่ป่าพรุมิดินทั้งสองอย่างปะปนกัน (peat and muck soil) ป่าพรุได้รับน้ำจากน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีทางระบายน้ำตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จึงทำให้สังคมสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากป่าบึงน้ำ

2. ระบบนิเวศชายฝั่ง

ชายฝั่งของประเทศไทย ทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ มีความยาวรวมทั้งสิ้นกว่า 2,614 กิโลเมตร และครอบคลุมเกาะต่าง ๆ ในอ่าวไทย และทะเลอันดามันมากกว่า 128 เกาะ ระบบนิเวศชายฝั่งในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

2.1 ป่าชายหาด

ป่าชายหาด (beach forest) ปกคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นดินทรายหรือหาดทรายเก่าที่ยกตัวสูงขึ้น และบริเวณฝั่งทะเลที่เป็นหินกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่งของทะเล สลับกับป่าชายเลน ป่าชนิดนี้ที่ยังมีสภาพดั้งเดิม อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ประกอบด้วยพืชที่ขึ้นในที่แห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนน้ำจืดในระยะยาว ดินในป่าชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นดินทราย เก็บรักษาน้ำในดินไว้ได้ไม่นาน ธาตุอาหารในดินค่อนข้างน้อย จึงจัดเป็นป่าที่ให้ผลผลิตทางเนื้อไม้ต่ำ โครงสร้างของป่าจึงแปรผันไปตามลักษณะของดินและหิน ชายฝั่งที่เป็นดินทรายจึงอาจพบป่าสนทะเล (*Casuarina equisetifolia*) ซึ่งไม่มีไม้อื่นปะปน

2.2 ป่าชายเลน

ป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นป่าไม่ผลัดใบ ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเล บริเวณที่เป็นดินโคลนโดยเฉพาะปากแม่น้ำและลำคลองที่ไหลลงทะเล ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของ

ประเทศไทย มีส่วนที่เป็นป่าชายเลนอยู่ประมาณร้อยละ 36 ของความยาวชายฝั่ง พันธุ์พืชในป่าชายเลนได้วิวัฒนาการจนมีลักษณะแตกต่างจากชนิดพันธุ์พืชทั่วไปเช่น มีระบบรากเหนือพื้นดินที่ดิน แดก แฉกเป็นวงกว้างและมีความทนทานต่อความเค็มสูง ด้วยลักษณะที่พิเศษของป่าชายเลนนี้เองที่ทำให้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นไปได้ค่อนข้างยาก และป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่มักกลายสภาพเป็นป่าเสม็ดในที่สุด บริเวณที่ยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์กว่าบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอื่น ๆ ของประเทศคือ บริเวณฝั่งตะวันตกของภาคใต้ โดยเฉพาะในแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล (นิรนาม, ม.ป.ป.)

3. อุทยานแห่งชาติ

แบ่งออกเป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล และ อุทยานแห่งชาติทางบก ซึ่งอุทยานแห่งชาติทางบกนั้นจะประกอบไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยา จุดประสงค์ของการมีอุทยานแห่งชาติก็เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ๆ

อุทยานแห่งชาติตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า "National Park" ซึ่งหมายถึง เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวน ไว้เพื่อที่จะรักษา และทำการคุ้มครอง ทรัพยากรทางธรรมชาติ นั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป ตามหลักสากลแล้ว อุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมีพื้นที่ ทั่วทั้งบริเวณไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ที่สำคัญในพื้นที่ ของอุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมี ธรรมชาติของ วิถีชีวิตที่สืบทอดมา

ในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งได้ให้ความหมายของอุทยานแห่งชาติไว้ว่า ได้แก่ "บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน โดยรัฐจะประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า อุทยานแห่งชาติ ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่น ไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง" แนวคิดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ

ริเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี

หลักการสงวนรักษาที่ดินที่มีสภาพธรรมชาตินั้นทำได้หลายแบบ หลายระดับ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ, และ สวนรุกขชาติ ในส่วนอุทยานแห่งชาติของไทยนั้น แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเล

อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของไทย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่, เป็นต้น การกระทำสิ่งใดในบริเวณอุทยานแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (นิรนาม, 2550)

4. สัตว์ป่า

คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือน้ำและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณตามกฎหมาย ว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้วและสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะ ดังกล่าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้ถูกทำลายลงไปมาก ตลอดจนการไล่ล่าของมนุษย์ยังทำให้ปริมาณสัตว์ป่ามีจำนวนลดน้อยลงทุกปีจนบางชนิดสูญพันธุ์บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติจึงจำเป็นที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้โดยเร่งด่วน

4.1 ประเภทของสัตว์ป่า

เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสัตว์ป่าให้มีชีวิตสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังจึงมีการออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ประเภท คือ

4.1.1 สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากบางชนิด สูญพันธุ์ไปแล้วมีอยู่ 15 ชนิด คือ นกเงือกหัวหงก สัตว์มีพิษ แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายนก ละอง หรือละมั่ง สมันหรือ เนื้อสมัน เลียงผา นกเด้าแล้วท้องดำ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อและพะยูนหรือหมูน้ำ

4.1.2 สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ทั้งที่ปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหาร ทั้งที่ไม่ใช่ล่าเพื่อการกีฬาและล่าเพื่อการกีฬา ตามที่กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ มากกว่า 200 ชนิด เช่น ค่าง ชะนี อีเห็น ไก่ฟ้า เขี้ยว ช้างป่า แร้ง กระทิง กวาง หมูควาย อีเก้ง นกเป็ดน้ำ เป็นต้น

4.2 บทลงโทษ

ทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่า คุ้มครอง ห้ามมิให้ผู้ใดทำการล่ามิไว้ในครอบครอง ค้าขายและนำเข้าหรือส่งออก หากผู้ใดฝ่าฝืนต้อง ระวังโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ในปัจจุบันสัตว์ป่ามีจำนวนลดน้อยลงมาก ชนิดที่สมัยก่อนมีอยู่ชุกชุมก็ไม่ค่อยได้ พบเห็นอีกบางชนิดก็ถึงกับสูญพันธุ์ไปเลย ปัญหานี้สาเหตุมาจาก

4.2.1 ถูกทำลายโดยการล่าโดยตรงไม่ว่าจะล่าเพื่ออาหารหรือเพื่อการกีฬาหรือเพื่อ อาชีพ

4.2.2 การสูญพันธุ์หรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเอง ถ้าหากไม่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า

4.2.3 การนำสัตว์ป่าต่างถิ่น (Exotic animal) เข้าไปในระบบนิเวศสัตว์ป่าประจำถิ่น ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตว์ป่าประจำถิ่นจนอาจเกิดการสูญพันธุ์

4.2.4 การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งก็ได้แก่การที่ป่าไม้ถูกทำลายด้วย วิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยถากถางและเผาเพื่อทำการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เช่น การตัดถนนผ่าน เขตป่า การสร้างเขื่อน ฯลฯ ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะที่ยืน ที่อยู่อาศัยถูกทำลาย

4.2.5 การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค้าง เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบศัตรูพืชจะทำให้เกิดการสะสมพิษในร่างกายทำให้บางชนิดถึงกับสูญพันธุ์ได้

4.3 การอนุรักษ์สัตว์ป่า

สัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงคนเราด้วยทั้งโดยตรงและทางอ้อม จึงต้องมีวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจำนวนหรือสูญพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้

4.3.1 กำหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ให้มีมากเพียงพอ

4.3.2 การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง

4.3.3 การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการค้าสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจำนวนลงอย่างมากทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ

4.3.4 การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะทำให้ป่าไม้ถูกทำลายแล้วยังเป็นการทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย

4.3.5 การปลูกฝังการให้ความรักและเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรักชีวิตเหมือนกับมนุษย์ การฆ่าสัตว์ป่า การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นการทรมานสัตว์ป่า ซึ่งมักไม่มีชีวิตรอด

4.3.6 การเพาะพันธุ์เพิ่มสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์หรือมีจำนวนน้อยลง ควรมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนและเร่งให้มีสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น (นิรนาม, ม.ป.ป.)

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกที่มีความสามารถในการเก็บ ข้อมูลด้านแผนที่หรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพต่างๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite images) ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial photographs) เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้สามารถนำ ข้อมูลแผนที่

ที่หรือข้อมูลภาพต่างๆของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งข้อมูลแต่ละด้านจะ ถูกจัดเก็บไว้ใน โปรแกรมใน ลักษณะของข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Layer) หรือการซ้อนทับข้อมูล (Overlays) หรือชั้นข้อมูล (Coverages) แล้วสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ ข้อมูลในพื้นที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กลุ่มของระบบสารสนเทศกลุ่มหนึ่ง ที่มีความ แตกต่างจากระบบสารสนเทศอื่นๆ โดยที่องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ชี้ให้เห็นความแตกต่าง ดังกล่าวคือข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการอ้างอิงตำแหน่งบนโลกที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ฉะนั้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ในแขนงสาขาต่างๆที่ เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งสิ้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือระบบ GIS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) โดยข้อมูลลักษณะต่างๆในพื้นที่ที่ทำการศึกษาจะถูกนำมา จัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและรายละเอียดของ ข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามต้องการ

จึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและ สารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ หรือจะกล่าวอย่างง่าย ๆ ก็ได้ว่าเป็นการจัดการ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของ ตารางข้อมูล และ ฐานข้อมูลที่มี ส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้ สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ สัมพันธ์กับช่วงเวลาได้ ใช้เป็นชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล รักษา ข้อมูลและการค้นคืนข้อมูล เพื่อจัดเตรียมและปรับแต่งข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการ แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การแพร่ขยายของโรค ระบาด การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การบุกรุกทำลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมาย นำไปใช้งานได้ง่าย

GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยง กับสภาพภูมิศาสตร์อื่นๆ สภาพท้องที่ สภาพการทำงานของ ระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและ พื้นที่จริงบนแผนที่ ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล

คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database) การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่นสามารถจะค้นหาตำแหน่งของ จุดตรวจวัดควันทา - ควันทาได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตำแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะ ต่างจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพ เพียงอย่างเดียวแต่ แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอนข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล เชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้น โลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีตำแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตำแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ สำหรับข้อมูล GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของบ้าน (รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มีตำแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพื้นโลก เนื่องจากบ้านทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ำกัน

ละติจูด (Latitude) หรือเส้นรุ้ง เป็นพิกัดที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลก โดยระบุว่าตำแหน่งนั้นอยู่ตรงจุดที่ทำมุมเท่าไรกับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ละติจูดมีค่าตั้งแต่ 0 องศาที่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึง 90 องศาที่บริเวณขั้วโลก (นับเป็น 90 องศาเหนือหรือใต้ คือวัดเป็นมุมจากเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปจนถึงแนวตั้งที่ขั้วโลกเหนือ หรือลงไปจนถึงแนวตั้งที่ขั้วโลกใต้) พื้นที่ที่มีพิกัดละติจูดต่างกัน จะมีสภาพภูมิอากาศ (Climate) และกาลอากาศ (Weather) ต่างกัน เช่นแบ่งเป็นเขตร้อน เขตอบอุ่น และเขตหนาว

ลองจิจูด (Longitude) หรือเส้นแวง เป็นพิกัดที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลกโดยวัดไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกจากเส้นสมมติในแนวเหนือใต้ที่เรียกว่า เส้นไพรม์เมอริเดียน (Prime Meridian) ลองจิจูดมีหน่วยเป็นองศา นับจาก 0 องศาที่เส้นไพรม์เมอริเดียน ไปทางตะวันออก +180 องศา และไปทางทิศตะวันตก - 180 องศา ลองจิจูดต่างจากละติจูดตรงที่ละติจูดมีเส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นอ้างอิงตามธรรมชาติ แต่ลองจิจูดไม่มี จึงต้องกำหนดเส้นสมมติขึ้นมา 1 เส้นสำหรับอ้างอิง ในการประชุมเมริเดียนนานาชาติ (International Meridian Conference) เมื่อ พ.ศ. 1884 จึง

ได้กำหนดให้เส้นเวลากรีนนิชที่ผ่านหมู่บ้านชื่อเดียวกันที่ใกล้ๆ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นไพรม์เมอร์เดียนและเป็นลองจิจูดที่ 0 องศา

6. ความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)

Google Earth คือ

กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) เป็นโปรแกรมสำหรับการใช้ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ ซึ่งโปรแกรมนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบงานด้านภูมิสารสนเทศ (GIS-Geographic Information System)

กูเกิลเอิร์ธ ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจากหลายที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียม เช่น DigitalGlobe, EarthSAT เป็นต้น

สำหรับภาพดิกจาลอง 3 มิติ ที่มีลักษณะเป็นสีเทาในกูเกิลเอิร์ธ ได้รับลิขสิทธิ์ส่วนหนึ่งมาจากซอฟต์แวร์ของ แซนบอร์น (Sanborn) ในชื่อ ซิตี้เซตส์ (CitySets) โดยรูปดิก 3 มิติในรูปแบบที่สมบูรณ์สามารถเรียกดูได้ผ่านทางซิตีเซตส์

การทำงานของกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) จะเป็นการทำงานแบบ Client-Server โดยในส่วนที่ใช้ควบคุม และแสดงผล เรียกว่าโปรแกรม Google Earth Client ซึ่งการใช้งานต้องต่อเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเพื่อจะได้ดึงภาพที่อยู่บน Server ของกูเกิลมาแสดงได้

โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ไม่ได้เก็บไฟล์ภาพแผนที่ไว้ในโปรแกรม เพียงแต่มันทำหน้าที่อ่านค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูด ที่ผู้ใช้องการดูภาพ แล้วโปรแกรมจะวิ่งเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลเอิร์ธ จากนั้นก็ดาวน์โหลดไฟล์ภาพแผนที่มาแสดงทันที นั่นก็หมายความว่า โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ดูภาพถ่ายดาวเทียม จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วย และควรจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สำหรับตำแหน่งของสถานที่ที่ปรากฏในโปรแกรมนั้นจะมีเพียงหลักๆ เท่านั้น เช่นชื่อประเทศ ชื่อเมือง จังหวัด รัฐ สำหรับรายละเอียดสถานที่นั้น จะเน้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ส่วนที่อื่นๆ ในโลกนั้นแทบไม่มีเลย โดยกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) จะถือปรัชญาที่ว่า คนที่รู้จักสถานที่ดีที่สุด ก็คือคนพื้นที่นั้นนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ตัวโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) จึงมีเครื่องมือเครื่องมือให้ผู้ใช้งานสามารถระบุสถานที่เองได้ ซึ่งจะเรียกว่า *Placemark* หรือที่เรียกกันว่า *ปักหมุด* นั่นเอง สำหรับคอ GPS คงจะคุ้นกับคำว่า POI (Point of Interest) มากกว่า ซึ่งก็คือสิ่งเดียวกัน (ชัยศิลป์, 2548)



ภาพที่ 1 หน้าแรกของโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)

โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) คือโปรแกรมที่ใช้แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของสถานที่ต่าง ๆ ในโลกนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยที่มนุษย์สามารถถ่ายรูปจากมุมสูงที่มีความละเอียดสูงเหนือชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้เป็นเพราะความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติที่พัฒนาศาสตร์ องค์ความรู้ให้สามารถทำในสิ่งที่เหลือเชื่อได้ และเป็นที่เชื่อกันว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ จะมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมที่ปรากฏใน Google Earth มีประโยชน์ ในหลายด้าน เช่น


6.1 การวางแผนการท่องเที่ยว: นักท่องเที่ยวสามารถที่จะวางแผนและกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวได้ในกรณีที่สถานที่นั้นอยู่อีกซีกหนึ่งของโลก หรือใช้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวประกอบกับเว็บไซต์แนะนำ

6.2 การสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าถึงได้ยาก: ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก บางครั้งการต้องอาศัยภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อช่วยในการกำหนดเส้นทางในการที่จะเข้าถึงสถานที่นั้น

6.3 ใช้ในกิจการความมั่นคง: ในเรื่องความมั่นคงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนั้นสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารทางเปิดร่วมกับการใช้ข่าวสารทางลับ

6.4 ฝ้าตรวจทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน: การฝ้าตรวจทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลนโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นเรื่องที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝ้าตรวจเพราะ ทรัพยากรเหล่านี้มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง ภาพถ่ายดาวเทียมที่ปรากฏใน Google Earth จะช่วยให้เห็นภาพจากมุมสูงครอบคลุมภูมิประเทศเป็นบริเวณกว้าง

6.5 ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน: ในการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิศวกรรมแผนที่ ฯลฯ โดยวิชาเหล่านี้สามารถใช้ภาพจาก Google Earth ช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอน (ทอทหาร, 2548)



ภาพที่ 2 โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)

7. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) กับงานประเภทต่างๆ

ด้วยความสามารถในการจัดการกับภาพถ่ายดาวเทียมอย่างเอี่ยมยอด ใช้งานง่าย และมีโครงสร้างที่เอื้อให้สร้างข้อมูลอื่นซ้อนประกอบลงไป ทำให้เราสามารถนำเอากูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) มาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้อย่างมากมาย แนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)

7.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


โดยการนำภาพถ่ายดาวเทียมไปใช้ในการวิเคราะห์การอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่แข่ง ว่าในรัศมีโดยรอบนั้น ภูมิทัศน์เป็นอย่างไรบ้าง และถ้าเป็นนายหน้าค้าที่ดินก็สามารถเอามาสำรวจที่ดินเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลในการซื้อและขาย รวมถึงการฟรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังอีกด้วย และสามารถนำโปรแกรมนี้ตรวจสอบว่าจริงดังโฆษณา หรือไม่



ภาพที่ 3 งานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7.2 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

สำหรับสถาปนิกและวิศวกร ก็คงมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นในการจำลองโมเดลงานก่อสร้างที่ได้ออกแบบเอาไว้ ซึ่งพวกเขาสามารถสร้างเป็นโมเดลสามมิติขึ้นมา ซ้อนทับพื้นที่จริง แล้วดูภูมิทัศน์โดยรอบว่า ได้ตามที่ได้ออกแบบเอาไว้หรือไม่ ส่วนนี้ยังสามารถฟรีเซนต์งานให้กับลูกค้าได้เห็นภาพจริงตามที่จินตนาการไว้อีกด้วย เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจในการฟรีเซนต์ทีเดียว



ภาพที่ 4 งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

7.3 ใช้คู่มือวิจัย

เป็นการประยุกต์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การใช้กูเกิลเอิร์ธมาคู่มือวิจัย เพราะหนึ่งในการคู่มือวิจัยก็ต้องดูข้อมูลรอบข้าง ดูว่ากระแสที่จะไหลมา ว่ามาจากทางใดได้บ้าง แล้วมาจากที่ไหนมุมไหน มีตัวตัดกระแสตรงไหน รวมทั้งทางน้ำเข้าออกต่างๆที่น่าสนใจก็คือชินแสสามารถใช้โปรแกรมนี้หาองศาของสถานที่ที่จะคู่มือวิจัยถึงที่จริง

7.4 ธุรกิจคอนโด อพาร์ทเมนต์ให้เช่า

ธุรกิจให้เช่าสถานที่ ต่อไปคนที่ต้องการหาที่เช่า อาจจะหาข้อมูลโดยเริ่มจากสำรวจสถานที่ที่สนใจก่อน โดยใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธสำรวจ จากนั้นก็ค่อยมาเลือกดูข้อมูลในขั้นตอนถัดไป



ภาพที่ 5 งานด้านธุรกิจคอนโด อพาร์ทเมนต์ให้เช่า


7.5 ธุรกิจท่องเที่ยว

ต่อไปนักท่องเที่ยวจะมีทางเลือกในการดูข้อมูลท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง นั่นก็คือเข้ามาดูภูมิทัศน์ของสถานที่ก่อน จากนั้นก็ค่อยเข้าไปดูข้อมูลประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการมาเกาะพะงัน เขาก็อาจจะใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธมาส่องดูเกาะพะงันก่อน จากนั้นก็ค่อยเลือกพื้นที่ที่ติดหาดที่ตัวเองสนใจ แล้วค่อยไปเลือกที่พักที่ใกล้กับหาดนั้น

ดังนั้นถ้าคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพตรงนี้ ก็สามารถที่จะปักหมุดให้ธุรกิจของตัวเองพร้อมกับให้ข้อมูลคณิกท่องเที่ยวที่จะมาหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ เรียกได้ว่าต่อโปรแกรมนี้จะมีผลต่ออุตสาหกรรมนี้มากพอสมควร ถ้าพฤติกรรมของคนใช้เริ่มเปลี่ยน เผลอเช่นเดียวกับตอนนี้ที่นักท่องเที่ยวหาข้อมูลต่างๆผ่าน Search Engine อย่าง google.com มากขึ้นนั่นเอง

7.8 ธุรกิจสื่อสารมวลชน

งานข่าว โดยเฉพาะทีวีและหนังสือพิมพ์ บ่อยครั้งที่รายงานข่าวในพื้นที่ต่างๆ แล้ว นอกจากภาพถ่ายในสถานที่จริง บางครั้งถ้ามีการให้ดูภาพรวมพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราว จะทำให้ความเข้าใจในเนื้อหาชัดเจนยิ่งขึ้น กูเกิลเอิร์ธสามารถสนับสนุนตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น บอกว่าเกิดภัยพิบัติในประเทศหนึ่ง เราต้องการนำเสนอภูมิศาสตร์ของเมืองและประเทศให้ผู้ชม ก็ใช้กูเกิลเอิร์ธเข้าไปดูได้ทันที




ภาพที่ 7 งานด้านธุรกิจสื่อสารมวลชน

7.9 ธุรกิจลอจิสติก (ขนส่ง)

แน่นอนที่สุดธุรกิจนี้ผูกพันกับการใช้แผนที่อย่างเหนียวแน่น กลุ่มนี้สามารถเอา ระบบGPS และRFID (การตรวจสอบ หรือตรวจนับสินค้าด้วยคลื่นวิทยุ) มาใช้ร่วมกับแผนที่อย่างกูเกิลเอิร์ธ หรือกูเกิลแมป เพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทาง การตรวจสอบสินค้าผ่าน

7.10 การเรียน การสอน

ต่อไปวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จะสนุกมากยิ่งขึ้น เพราะครูสามารถที่สอนพร้อมกับท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆในโลก และอธิบายเรื่องราวประกอบได้อย่างง่ายๆทั้งนี้รวมถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมก่อสร้างอีกด้วย ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้



ภาพที่ 8 งานด้านการเรียน การสอน

7.11 งานทางด้านชีววิทยา

ตอนนี้มีคนใช้กูเกิลเอิร์ธไปประยุกต์ใช้กับงานชีววิทยาพอสมควร เช่นการติดตามการว่ายน้ำของปลาฉลามวาฬ โดยแท็คตำแหน่งผ่านดาวเทียม แล้วนำข้อมูลมาพร้อมตำแหน่งผ่านกูเกิลเอิร์ธอีกทีหนึ่ง หรือการใช้ในการติดตามการอพยพของนกต่างๆ

ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือมีการนำเอาไปใช้ในการติดตามการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกแล้ว เพื่อให้ทราบถึงอัตราการระบาดในประเทศต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดนก

7.12 งานป้องกันระวังภัย

มองในมุมมองที่หลายคนกลับไปว่าโปรแกรมนี้จะสร้างปัญหาในการรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ แต่จริงๆแล้วในทางตรงกันข้าม เราสามารถใช้ความสามารถของโปรแกรมเอาไว้เตรียมการเรื่องการป้องกันระวังภัยได้เช่นเดียวกัน ว่าตำแหน่งไหนควรจะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเอาไว้ ภาพทั้งหมดจะเป็นอย่างไร และพื้นที่ใกล้เคียงจุดไหนบ้างที่หลบหลวมหรือมีช่องโหว่ เป็นต้น



ภาพที่ 9 งานด้านงานป้องกันระวังภัย

7.13 งานโบราณคดี

มีนักโบราณคดีกลุ่มหนึ่งที่ใช้กูเกิลเอิร์ธในการวางแผนไปสำรวจ และขุดเจาะพื้นที่ที่น่าจะเป็นแหล่งทางโบราณวัตถุ โดยนำไปใช้ผสมผสานกับวิธีการเดิมด้วย ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ว่า กูเกิลเอิร์ธช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นมาก

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

อุปกรณ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

เนื่องจากโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) เป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องค่อนข้างสูง ทั้งการประมวลผล และการแสดงผล ดังนั้นถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเครื่องรุ่นเก่า ควรตรวจสอบสเปคของเครื่องว่าสามารถรันโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องมีการอัปเกรดโดย คอมพิวเตอร์ควรมีสเปค ดังนี้

1.1 สเปคต่ำสุดที่สามารถใช้งานกูเกิลเอิร์ธได้

1.1.1 Microsoft Windows 2000 or XP

1.1.2 Pentium 3,500 MHz

1.1.3 128 MB RAM

1.1.4 400 MB disk space

1.1.5 ต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็ว 128 kbits/sec

1.1.6 3D-capable video card ที่มี VRAM 16 MB ขึ้นไป

1.1.7 จอความละเอียด 1024x768 จุด แสดงผลแบบ 16-bit High Color (64 สี)

1.2 สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แนะนำให้ใช้งาน

1.2.1 Microsoft Windows XP

1.2.2 Pentium4 2.4 GHz + or AMD 2400 XP+

1.2.3 512 MB RAM

1.2.4 2 GB disk space

1.2.5 ต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็ว 768 kbit/sec ขึ้นไป (ADSL/Cable)

1.2.6 3D-capable video card ที่มี VRAM 32 MB ขึ้นไป

1.2.7 1280x1024 จุด แสดงผลแบบ 32-bit True Color (16 ล้านสี)

2. โปรแกรมที่ใช้งาน

2.1 Browser Internet Explorer (สืบค้นข้อมูลต่างๆ และอัปโหลดข้อมูล)

2.2 โปรแกรม Google Earth Version 4.2 Beta (ปักหมุด)

2.3 โปรแกรม Microsoft Excel 2003 (จัดทำฐานข้อมูล)

2.4 โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 (ตกแต่งภาพ)

3. เอกสารวิชาการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธ์ุพืช และนิตยสาร Trip

ฉบับรวมอุทยานแห่งชาติ

วิธีการ

1. ค้นหาข้อมูลอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

1.1 อุทยานแห่งชาติทั้งหมดของประเทศไทย สัตว์ป่า และพันธุ์พืชค้นหาได้จาก แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยและหนังสือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Trips Magazine ฉบับ รวมอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย

1.2 ตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งจากเว็บไซต์ของกรมแผนที่ทหาร (Digital Thailand) ข้อมูลแหล่งอนุรักษ์ กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรม และเนื่องจากมีบางอุทยานแห่งชาติที่ไม่ทราบพิกัดของอุทยานจึงยึดตำแหน่งของอำเภอ ตำบล หรือหมู่บ้านในบริเวณที่อยู่ของอุทยานแห่งชาตินั้น

2. จัดจำแนกทำฐานข้อมูล

โดยจำแนกเป็นอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไทย พิกัดที่ตั้งอุทยานแห่งชาติ ชนิดของสัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่พบ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2003

3. ศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)


เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน ซึ่งGoogle Earth เป็นโปรแกรมที่ใช้แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของสถานที่ๆในโลก โดยสามารถถ่ายรูปรูปจากมุมสูงได้มีความละเอียดสูงเหนือชั้นบรรยากาศ

4. ติดตั้งโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)


ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของGoogle Earth ที่แอดเดรส

<http://earth.google.com/download-earth.html> จะมีการแสดงสเปกเครื่องที่สามารถใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ได้ และเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน เนื่องจากตัวโปรแกรมไม่ค่อยรองรับเวลาเปิดไฟล์หมุดที่เป็นภาษาไทย คือเมื่อพิมพ์ภาษาไทยสระจะหาย ทำให้อ่านลำบาก ไม่สวยงาม


วิธีแก้ไข คือ ดาวน์โหลดไฟล์ที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ที่ thaigoogleeearth.com (โดยคุณ Nicknart) คลิกที่ ระบบภาษาไทยสำหรับ Google Earth อยู่คอลัมน์ขวา ดาวน์โหลดได้ตามปกติ




ภาพที่ 10 การดาวน์โหลดโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ(Google Earth)



ภาพที่ 11 การดาวน์โหลดโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ(Google Earth)



ภาพที่ 12 การดาวน์โหลดโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ(Google Earth)



ภาพที่ 13 วิธีแก้ไขระบบสำหรับภาษาไทย คือ ดาวน์โหลดไฟล์ที่สามารถแก้ไขปัญหานี้คลิกขวา แล้วเลือก Merge


5. การนำโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย

5.1 นำพิกัดของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมาเข้าโปรแกรมโดยพิมพ์ตำแหน่งเข้าไปในช่อง Fly To แล้วคลิกปุ่ม search โปรแกรมจะวิ่งไปชุมพื้นที่ที่ต้องการ โดยมีรูปแบบการค้นหาหลายแบบ เช่น

5.1.1 ตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด ในแบบตัวเลขทศนิยม เช่น 18.009086,89.370040

5.1.2 ตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด ในแบบองศาที่ตั่ง เช่น 13 35'55" N,100 34'22" E

5.1.3 ชื่อเมือง ประเทศ เช่น Khonkaen Thailand และมีอีกหลายรูปแบบ(เฉพาะอเมริกาเท่านั้น)



ภาพที่ 14 การใส่ค่าตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด

5.2 เมื่อชุมไปที่พื้นที่เป้าหมายแล้วจากนั้นเริ่มทำการปักหมุดเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งอุทยานแห่งชาติต่างๆ โดย


5.2.1 เลือกตำแหน่งที่ต้องการปักหมุด เลือกเมนู Add > Placemark แสดงขึ้นมา และมีหมุดไอคอน พร้อมกรอบสี่เหลี่ยมกระพริบอยู่ คลิกเมาท์ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

5.2.2 ตั้งค่ารายละเอียดสถานที่ที่ปักหมุด

1) Name : ตั้งชื่อสถานที่ที่ปักหมุด

2) Icon : เลือกหมุดที่ต้องการแสดง เมื่อคลิกบนรูปไอคอน จะมีหน้าต่างแสดงภาพไอคอนให้เลือก เลือกหมุดที่ต้องการ

- 3) Create In : เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ โดยคลิกปุ่ม New Folder
- 4) Description : กรอกคำอธิบาย (สามารถใช้คำสั่ง HTML ในการจัดรูปแบบข้อความได้)




ภาพที่ 15 การตั้งค่ารายละเอียดของการปักหมุด

5.3 เมื่อปักหมุดตามที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ โดยคลิกขวาที่หมุดที่ปักไว้ ไปที่ Properties

5.4 กรอกข้อมูล โดยใช้คำสั่ง HTML

5.4.1 Link ไปที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อดูข้อมูลเพื่อเดิม

- ด้วยคำสั่ง `<a href=" http://_____ "> ตั้งชื่อ </a>`




5.4.3 นำข้อมูลที่จัดทำฐานข้อมูล เกี่ยวกับสัตว์ป่า พันธุ์พืช ใน MS Excel ลงไป โดยอาจใช้คำสั่งเหล่านี้ ประกอบ

- การทำตัวอักษรหนา _____
- การทำตัวอักษรเอียง <I>_____</I>
- การขีดเส้นใต้ <U>_____</U>
- การเว้นบรรทัด

และคำสั่งอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน


5.5 เมื่อได้ข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว จากนั้นทำการบันทึกไฟล์ โดยเลือกโฟลเดอร์อุทยานแห่งชาติที่ต้องการสร้างไฟล์ สกุล .kmz

5.5.1 เลือกเมนู File> Save As ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม OK



ภาพที่ 18 การบันทึกไฟล์

หากเลือกบันทึกทั้งโฟลเดอร์ โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) จะสร้างไฟล์ที่เก็บรายการทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้น และถ้ามีการซ่อนรูปภาพด้วยก็จะ Copy รูปภาพนั้นไว้ในโฟลเดอร์ย่อยด้วย ดังนั้นหากต้องการบันทึกไฟล์ทั้งหมด จะต้องดูรายการที่ปกคลุมด้วย หากมากเกินไป หรือขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป ก็อาจจะมีผลต่อโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ได้



ภาพที่ 19 การบันทึกไฟล์เป็น *.kmz

หลังจากทำการบันทึกไฟล์เป็น *.kmz เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการลงทะเบียน และอัปโหลดผลงานขึ้นไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งอัปโหลดไฟล์ *.kmz จะต้องมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ การลงทะเบียนฟรี ตัวอย่างเช่น การอัปโหลดขึ้นที่ thaigoogleeearth.com โดยจะระบุชื่อผู้สร้างไฟล์ (kmz builder) ไว้ในผลงานแต่ละชิ้น เพื่อเป็นเครดิตแก่ผู้สร้างไฟล์นั้น

6. ขั้นตอนการลงทะเบียน

- 6.1 เข้าไปยังเว็บไซต์ www.thaigoogleeearth.com
- 6.2 คลิก ลงทะเบียนใหม่ ที่คอลัมน์ทางซ้ายมือ
- 6.3 กรอกรายละเอียด ชื่อ อีเมลล์และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม ส่งการลงทะเบียน
- 6.4 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยสามารถใช้ชื่อ และรหัสผ่าน
- 6.5 เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถอัปโหลดงานได้ โดย เข้าไปยังเว็บไซต์ www.thaigoogleeearth.com
- 6.6 ใส่ username และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้วกดEnter เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
- 6.7 คลิกเมนู upload file ทางซ้ายมือ
- 6.8 เว็บไซต์จะแสดงแบบฟอร์มสำหรับให้กรอกรายละเอียดในการอัปโหลดไฟล์

6.9 คลิกปุ่ม **Browse** แล้วเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ

6.9.1 ระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการให้แสดง เช่น National park

6.9.2 ระบุชื่อผู้สร้าง หรือชื่อผู้ปกคลุม เช่น Pannisa

6.9.3 เลือกหมวดหมู่ หรือ **Category** ที่ต้องการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไป

6.9.4 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ที่อัปโหลด

6.10 คลิกปุ่ม **submit file** เว็บไซต์จะแสดงข้อความว่าการอัปโหลดไฟล์สมบูรณ์แล้ว ก็จะทำการอัปโหลดไฟล์เสร็จสิ้น และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดูไฟล์ที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์

สถานที่และระยะเวลาทำการวิจัย

สถานที่

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระยะเวลาทำการวิจัย

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551

ผลและวิจารณ์

ผล

จากการค้นหาข้อมูลอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย พบว่ามีข้อมูลอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 148 อุทยานแห่งชาติ โดยมีรายชื่ออุทยานแห่งชาติ แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

1. ภาคเหนือ 59 อุทยานแห่งชาติ

แก่งเจ็ดแคว	ดอยหลวง	แม่ปิง
ขุนขาน	ดอยอินทนนท์	แม่ปืม
ขุนแจ	ดากสินมหาราช	แม่เมย
ขุนน้ำน่าน	ดาดหมอก	แม่ยม
ขุนพะวอ	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	แม่วังก์
ขุนสถาน	ถ้ำผาไท	แม่วะ
เขาค้อ	ถ้ำสะเกิน	แม่วาง
คลองตรอน	ทุ่งแสลงหลวง	รามคำแหง
คลองลาน	นันทบุรี	ลานสาง
คลองวังเจ้า	น้ำตกชาติตระการ	ลำน้ำกก
แจ้ซ้อน	น้ำตกพาเจริญ	ลำน้ำน่าน
ดอยขุนตาล	น้ำตกแม่สุรินทร์	ลุ่มน้ำคง (สาละวิน)
ดอยง	น้ำหนาว	เวียงโกศัย
ดอยผากลอง	ผาแดง (เขียงดาว)	ศรีน่าน
ดอยผ้าห่มปก	ภูสอยดาว	ศรีลานนา
ดอยภูคา	ภูหินร่องกล้า	ศรีสัชนาลัย
ดอยภูซาง	แม่เงา	ห้วยน้ำดัง
ดอยภูนาง	แม่จริม	ออบขาน
ดอยเวียงผา	แม่ตะไคร้	ออบหลวง
ดอยสุเทพ-ปุย	แม่โถ	

2. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 25 อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	น้ำตกห้วยยาง
แก่งกระจาน	เฉลิมรัตนโกสินทร์	ปางสีดา
เขาคิชฌกูฏ	ทองผาภูมิ	พุเตย
เขาชะเมา-เขาวง	ทับลาน	ลำคลองงู
เขาสารภี	ไทรโยค	หมู่เกาะช้าง
เขาสิบพัน	น้ำตกคลองแก้ว	หาดวนกร
เขาแหลม	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	เอราวัณ
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	น้ำตกพลิว	
เขื่อนศรีนครินทร์	น้ำตกสามหลั่น(พระพุทธฉาย)	


3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 อุทยานแห่งชาติ

แก่งตะนะ	ป่าหินงาม	ภูผาเหล็ก
เขาพระวิหาร	ผาแต้ม	ภูพาน
เขาใหญ่	ภูกระดึง	ภูเรือ
ตาดโตน	ภูเก้า-ภูพานคำ	ภูลังกา
ตาพระยา	ภูจองนายอย	ภูแล่นคา
ไทรทอง	ภูผาเทิบ (มุกดาหาร)	ภูเวียง
นาูงน้ำโสม	ภูผาม่าน	ภูสระดอกบัว
น้ำพอง	ภูผายล	ภูสวนทราย (นาแห้ว)


4. ภาคใต้ 40 อุทยานแห่งชาติ

แก่งกรุง	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	หมู่เกาะเภตรา
เขานัน	น้ำตกซีโป	หมู่เกาะกระ-เกาะพระทอง
เขาน้ำค้าง	น้ำตกทรายขาว	หมู่เกาะลันตา
เขาปู่-เขาย่า	น้ำตกโยง	หมู่เกาะสิมิลัน
เขพนมเบญจา	น้ำตกสี่ขีด	หมู่เกาะสุรินทร์
เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	น้ำตกหงาว	หมู่เกาะอ่างทอง
เขาสก	บางลา	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
เขาลวง	บูโด-สุไหงปาดี	หาดเจ้าไหม

เขาหลัก-ลำรู่	ลำน้ำกระบุรี	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
คลองพนม	ศรีพังงา	แหลมสน
ตะรุเตา	สันกาลาคีรี	อ่าวพังงา
ได้ร่มเย็น	สิรินาถ	อ่าวมะนาว-เขาดินหยง
ทะเลบัน	หมู่เกาะชุมพร	
ธารโบกขรณี	หมู่เกาะพยาม	



ภาพที่ 20 ภาพรวมของการปึกหมุดอุทยานแห่งชาติ (ในมุมมองกว้าง)



ภาพที่ 21 ภาพรวมของการปักหมุดอุทยานแห่งชาติ (เจาะลึกบริเวณประเทศไทย)

ซึ่งในการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ในการทดลอง มีขนาดไฟล์ทั้งหมด 4.16 MB(*.kmz) โดยการศึกษาพบว่า มีพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด ประมาณ 1321 ชนิด และพันธุ์พืชทั้งหมดประมาณ 1451 ชนิด ซึ่งจะพบสัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่น่าสนใจ ดังนี้

พันธุ์สัตว์ป่า

ภาคเหนือ ได้แก่

กิ้งก่าแก้ว

กบดอยผ้าห่มปก

กบหลังไพล

กบห้วย

กบห้วยขาป๋ม

กระโดงแดง

กระต่ายป่ากระแตธรรมดา

กระทุ่มน้ำ

กระรอกบินจิ๋วท้องขาว

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คลองลาน ศรีสัชนาลัย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า-แม่วงก์-แม่ยม

กวางผา

กิ่งกำเขานามสั้น

กิ่งกำบินคองแดง

กิ่งกำบินคอสีส้ม

กิ่งกำบินปีกแดง

กิ่งกำหัวสีแดง

กิ่งกำหัวสีฟ้า

กิ่งฝอยใน

ไก่อฟ้าสีเงิน

ไก่อฟ้าหางลายขวาง

เจียดงู

เจียดป่าไผ่

เจียดว้าก

เจียดหลังปทุมที่ราบ

ควายป่า

คางคกหัวราบ

ค้างคาวขอบหูกลาง

ค้างคาวขอบหูขาว

ค้างคาวดอย

ค้างคาวปีกอุ้งครางแดง

ค้างคาวไฟหัวแบนเล็ก

ค้างคาวมงกุฎมลายู

ค้างคาวมงกุฎเล็ก

ค้างคาวลูกหนูถ้ำ

ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่

ค้างคาวไอ้แห้วน้อย

ค่างเทา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง (เชียงดาว) แม่ปิง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน - นันทบุรี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ว้าง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ว้าง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ว้าง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม-ศรีสัชนาลัย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน-ดอยสุเทพ-ปุย

พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน-ศรีสัชนาลัย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

พบในพื้นที่อุทยานชาติน้ำหนาว

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา

งูทางมะพร้าวธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
งูแมวเซา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
งูลายสอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
งูลายสอคอแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
งูสาม่านพระอินทร์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
งูเส้าหางม้าเทา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
จิ้งจกจันทน์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
จิ้งจกดินจืดลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
จิ้งจกบ้านหางแบนเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
จิ้งเหลนเรียวจุดดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม
จิ้งเหลนหางยาว	พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี-รามคำแหง
ตัวกลางคกผา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยผ้าห่มปก
ตะพาบธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน
นกกกระช๊อ	พบในพื้นที่อุทยานชาติน้ำหนาว
นกกกระช๊อเขียวปีกสองแถบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
นกกกระช๊อสีเทา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
นกกกระช๊อธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
นกกกระช๊อสีข้างแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-แม่ปิง
นกกกระช๊อใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
นกกกระช๊อเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
นกกกระช๊อหัว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
นกกกระช๊อเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยขุนตาล
นกกกระช๊อเล็กธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน-ศรีลานนา
นกกกระช๊อหัวดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
นกกกระช๊อเล็กขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
นกกกระช๊อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยหลวง
นกกกระช๊อเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

นกกาแวน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-ศรีลานนา
นกกินปลีหางยาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ว่าง
นกกินแมลงปากอกสีน้ำตาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
นกขุนทองนกยางเขนดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
นกเขาเขียวก้านทองท้องสีส้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
นกเขียวก้านทองหน้าผากสีทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
นกเงือกคอแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
นกจาบคาเคราน้ำเงิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ว่าง
นกชายเลนน้ำจืด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยขุนตาล
นกแซงแซวเล็กเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
นกเดินดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
นกตั้งล้อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า-แม่ยม
นกไต่ไม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
นกไต่ไม้ท้องสีเมืงมะขาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
นกนิลควาท้องสีส้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
นกปากซ่อมหางพัด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยขุนตาล
นกปีกสั้นสีน้ำตาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
นกเป็ดน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
นกเป็ดน้ำเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี
นกพวงคิ้วดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม
นกพวงใหญ่พันธุ์อินเดีย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
นกพญาไฟเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
นกมุ่นรอกคอแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
นกมูม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
นกยางโทนน้อย	พบในพื้นที่อุทยานชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
นกยางไฟหัวน้ำตาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยขุนตาล
นกกระจัดธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

นกสีวะหางสีน้ำตาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
นกหก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
นกหัวขวานตะโพกแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
นกหัวขวานใหญ่สีเทา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
นกเหงือก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
นกอีล้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
นกอีวาบตั๊กแตนนกบั้งรอกใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยขุนตาล
นกอีเสือหัวดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
นางแอ่นตะโพกแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
ปลาจกคัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
ปลากระดี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ปลากะมั่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
ปลาเข็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง-ศรีลานนา
ปลาเขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปลาเขียวหางแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
ปลาค้างคาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ปลาชิวแก้ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
ปลาตะเพียนแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
ปลาติ๊ดดิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ปลาไน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
ปลาบู่ทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
ปลาพุง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปลาหมอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ปลาหมอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปลาแม่เปป	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ปลาสาคร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ปลาสาวย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน-แม่ปิง
ปลาหมอตาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ปลาไหลนา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ปลาไหลนาปลาคูกอูย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ปาดกระชาเขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ปาดกระชรรวมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปาดกระป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ผีเสื้อโกเซอร์อิมพีเรียล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยผ้าห่มปก
ผีเสื้ออุททองป่าสูง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ผีเสื้อสะพายฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
พญากระรอกท้องดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
เพรกริน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
เข้ขีด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน-แม่ยม
ลิ้นกระต่ายป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ลิ้นพันธุ์ขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ลิ้นใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดหมอก
สัตว์ฟันแทะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
เสือป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
หนูขนเลี่ยน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน
หนูขนเลี่ยนคอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
หนูผีนา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
หนูฟันขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน
หนูหญ้าคอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
หนูหริ่งไม้หางพู่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน
หมาป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ-น้ำหนาว
หมาหริ่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
หอยกาบน้ำจืด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

เหยี่ยวดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เหยี่ยวต่างสี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
เหยี่ยวนกเขาชิครา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย-ขุนแจ
เหยี่ยวนกเขาหงอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
อ้นกลาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
อึ่งแม่หนาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
อี่เห็นเครือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย-ศรีลานนา รามคำแหง
อึ่งกรายตาขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อึ่งกรายห้วยเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อึ่งกรายหัวเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อึ่งปากขวด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน-นันทบุรี
อึ่งลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง- ห้วยน้ำดัง
อึ่งอืด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
อึ่งอืดข้างซิด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ได้แก่

กบเกาะช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
กบชะง่อนหินเมืองเหนือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
กบป่าไผ่ใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
กบหงอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
กระรอกแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลั่ว
กระรอกหลากสีสีแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
กระราง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
กิ้งก่าขนาดเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
กิ้งก่าบินหัวแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
กิ้งก่ายักษ์หรือลั้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
กิ้งก่าหัวสีฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ไก่อ่าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ไถ่ฟ้าหลังขาวจันทบูรณ์

เจียดทราย

เจียดหลังปุม

เจียดหิน

เจียดอ่องเล็ก

กางกหัวเรียบ

ค้างคาวคุณกิตติ

ค้างคาวปีกขน

ค้างคาวปีกอุ้งต่อมกาง

ค้างคาวปีกอุ้งใหญ่

ค้างคาวมงกุฎมลายู

ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง

ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่

งูเขียวพระอินทร์

งูเขียวร่อน

งูปลิง

งูปีแก้วลายหัวใจ

งูลายสาบเขียววันดำ

งูสิงหางลาย

งูหมอก

จิ้งจกบ้าน

จิ้งหรีด

ชะนีมงกุฎ

ช้าง

ตะกอล

ตะขาบท่ง

ตะพาบ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว-ไทรโยค

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ-ปางสีดา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน-ลำคลองงู

ตุ๊กแต่นหวดสั้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ตุ๊กแกบิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
ตุ๊กแกป่าตะวันออก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว-น้ำตกคลองแก้ว
ตุ๊กแกบ้าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
தாக	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
นกระจอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
นกระจัดขาวโลกเหนือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกระจัดขาสีเนื้อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกระจัดหัวมงกุฏ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกระเด็นน้อยธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
นกระเด็นลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
นกระเด็นใหญ่ธรรมดากำกวม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
นกระดาดแข้งเขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
นกระดาดสร้อยคอใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
นกระดาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
นกระดาดขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน-เขาสิบห้าขึ้น
นกระดาดแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
นกกะตีด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
นกกะรางหัวขวาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
นกกางเขนน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา
นกกินปลีคอแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว
นกเขาเหยี่ยว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
นกเขียวก้านทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา
นกเค้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา
นกเค้าหน้าผากขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นกเค้าเหยี่ยว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
นกเงือกดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา
นกจับแมลงคอสีน้ำตาลเงินเข้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

นกจับแมลงคอสีฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
นกจับแมลงสีฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค-น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น (พระพุทธราย)
นกเขียวดวงสีน้ำตาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
นกเขาสวรรค์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา
นกตะขาบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน-ลำคลองงู
นกแต้วแล้วธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา-หมู่เกาะช้าง
นกแต้วแล้วอกเขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกน้อตี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกนางนวลแกลบดำปีกขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกนางแอ่นตะโพกแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
นกนางแอ่นลม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
นกบั้งรอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
นกปรอดดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
นกปรอดหน้าขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกพญาปากกว้างสีดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
นกพญาปากกว้างหางยาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
นกพิราบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
นกโพระดกคางแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
นกมุ่นรกภูเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
นกยางกรอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี-หาดวนกร
นกยางกรอกพันธุ์จีนนกยางโทนใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
นกยางแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
นกยางไฟธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
นกกระวังไฟ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
นกหลุมพ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

นกเลื้อยแมลงหัวขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
นกแสก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
นกหัวขวานเคราะจุรูปหัวใจ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
นกหัวโตทรายใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
นกอัญชันคิ้วขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
นกอัญชันนอกเทา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
นกอินทรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
นกอีโก้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
นกแอ่นพง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
นกแอ่นฟ้าหงอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
ปลากระสง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ปลากดหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลั่ว
ปลากดเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง
ปลากระเบน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ปลากระสง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
ปลากล้วยฟ้าหลังเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ปลาขี้ยก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ปลาเขยา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
ปลาแก้มขี้หมู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
ปลาจิ้งจก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลั่ว
ปลาจิ้งจอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปลาชะโอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา-ทับลาน
ปลาชิวหางกรรไกร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม-เขาชะเมา-เขาวง
ปลาชิวหางแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง-เขาคิชฌกูฏ- เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
ปลาดัก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน-ปางสีดา
ปลาคูกเนื้อเลน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
ปลาคะเพียนสมพงษ์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ปลาตีน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ปลานางอ้าว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ปลาบ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
ปลาปลาเลียหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
ปลาแป้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ปลาแป้นแก้ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา
ปลาแปบขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปลาแมว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
ปลาโมง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ปลาลัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ปลาสร้อยลูกกล้วย	พบในพื้นที่อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์น้ำตกพลั่ว
ปลาตีนสมุทรลายนํ้าเงิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ปลาไส้ตันตาแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน- เขาแหลม
ปลาหมู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
ปลาอาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปลิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ปาดจ๊วลายแถบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปาดจ๊วลายเลอะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปาดตีนเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปาดนิ้วแยกขาลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
ปาดบิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ปาดยักษ์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ปูกาญจนบุรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ปูตะนาวศรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ปูใบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ปูแป้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ผีเสื้อจิวหนอนมะพร้าวธรรมชาติ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ผีเสื้อณรจิ๋ว

ผีเสื้ออุทกธรรมดา

ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่

ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

ผีเสื้อหลวง

ฟองน้ำครก

มวนแดง

เม่นแผงคอใหญ่

เม่นเล็กหางพอง

แมงดา

แมงป่อง

แมลงปอขาแดง

ยุงน้ำจืด

ลิ้นพันธุ้มลาย

หนูป่า

หนูพุกใหญ่

หอยเบี้ยเล็ก

หอยเวียน

หอยหนาม

เหยี่ยวกิ่งกำสิดำ

เหยี่ยวชิครา

เหยี่ยวนกเขาชิครานกแอ่นตาล

เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น

เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา

เหลืออม

อีเห็นเครือ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด-น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย-เขื่อนศรี

นครินทร์ -เอราวัณ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อึ้งบ้าน

อึ้งแม่หนาว

อึ้งอิดขาเหลื่อง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ปางสีดา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

กบหมื่นปาดนิ้วแยกลาย

กบหูใหญ่

กระรอกบินเล็กแก้มขาว

กิ้งก่าสวนหัวแดง

กิ้งก่าสวนหัวสีน้ำเงิน

แก้งธรรมชาติ

เจียดท้ายทอยดำ

เจียดลิ้น

ค้างคาวขอดกล้วย

ค้างคาวขอดกล้วยผีเสื้อ

งูเก่า

งูดิน

งูทับสมิงคา

งูทางมะพร้าว

งูปล้องจนวนลาว

งูแม่ตะงาว

งูลายสอบ้าน

งูสายม่านธรรมชาติ

งูหัวกะโหลก

จิ้งจกป่าสีจาง

จิ้งจกหางแบนเล็ก

จิ้งเหลนภูเขาเขมร

จิ้งเหลนภูเขาลายจุด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน-ภูเวียง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน-แก่งตะนะ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน

ตะเพียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุสุมาราย (นาเห้ว)
ตัวหอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุสุมาราย (นาเห้ว)
ตุ๊กแกเขาคันทาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
นกกะจีด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
นกกะจิบญ้ออกเทา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุเวียง
นกกะจีดธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
นกกะจีดสีคล้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
นกกะตีด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
นกกะเต็น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
นกกะเบื่องผา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
นกกอกกอด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุสุมาราย (นาเห้ว)
นกขมิ้นดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
นกคุ้มอี๊ดใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
นกเค้าดินสวน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ-ภูกระดึง
นกนางแอ่นลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
นกนางแอ่นสะโพกแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
นกปีกลายสีก๊อด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร-ดาดโตน
นกพญาไท	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา
นกพิราบป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุเวียง
นกยางไฟ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
นกอีแพรดแถบอกดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
ปลาชดขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุเวียง
ปลาชดหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
ปลากรด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ปลากระโห้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ปลาเกย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ปลาโกล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

ปลาก้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ปลาช่อนงูเห่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)
ปลาคูก้าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร-ภูพาน-ภูเวียง
ปลาตะเพียนทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ปลาเทโพ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ-ผาแต้ม
ปลานวลจันทร์เทศ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ปลาน้ำจืด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ปลาบึก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ-ผาแต้ม
ปลาบู่ทราย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ปลาร่องไม้ดัด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
ปลาหมากยางหรือปลามงโกรย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ผีเสื้อจรมลายู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
ผีเสื้อเขมลายธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
ผีเสื้อหางดิ่งเฮเลน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
ผีเสื้อหางดุ่มอดัมสัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
พญาโล่ไก่ฟ้าหลังขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)
แมลงป่อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา
ลิ่มหรือนิ่ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
หนูจืด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
หนูหริ่งนาทางยาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
หนูห้วย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน-ภูแลนคา
อีงอียดเทาจุดดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ภาคใต้ ได้แก่	
<i>Phricotelphusa limula</i>	พบในพื้นที่อุทยานเข้าน้ำตกสี่ขีด
<i>Salangathelphusa brevimarginata</i>	พบในพื้นที่อุทยานเข้าน้ำตกสี่ขีด
กบเขาทองลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
กบเขาสูง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน

กบเขาหลังดอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
กบชะง่อนหินเมืองใต้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
กบดอร์เรีย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
กบตะนาวศรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกสี่ขีด เขาปู่-เขาย่า
กบนาหรือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
กบเนื้อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
กบหนองมลายู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
กบหลังดาพับ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
กระจงควาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ทะเลบัน
กระแตไต่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เขาหลัก-ลำรู่ -แหลมสน
กระรอกข้างลายท้องแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด -สิรินธร-ทะเลบัน
กระรอกดินหลังลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินธร
กระรอกลายท้องแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
กิ้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
กิ้งก่าเขาหนามขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
กิ้งก่าบินคอดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า -ทะเลบัน
กิ้งก่าต่อม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
กิ้งก่ามกราม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
กิ้งเกย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
กิ้งกิ้งขัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
กิ้งนาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
กิ้งน้ำตก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
กิ้งฝอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สิรินธร
กิ้งม้งกร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา -หมู่เกาะสุรินทร์
กิ้งแม่น้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบี่บุรี
ไก่อู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ไก่ฟ้าหน้าเขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง-เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
เขียดงูศุภชัย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกสี่ขีด
เขียดงูสวน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
เขียดปาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
คางคกไฟ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
คั้งลาวขอบหูขาวกลางคั้งลาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
หน้ายาวใหญ่	
คั้งลาวขอบหูขาวเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง น้ำตกสี่ขีด
คั้งลาวขอบหูขาวใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
คั้งลาวบัวฟันกลม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
คั้งลาวปีกถุงเคราดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า-หุบเกาะสิมิลัน
คั้งลาวมงกุฎ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
คั้งลาวแม่ไก่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหุบเกาะสุรินทร์
คั้งลาวแม่ไก่ป่าฝน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
คั้งลาวแวมไพร่แปลงเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
คั้งลาวหนูผี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหุบเกาะสุรินทร์
คั้งดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
งูเขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน-อ่าวมะนาว
	เขาดันหยง
งูเขียว หัวจิ้งจก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
งูเขียวดงลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
งูเขียวตุ๊กแก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
งูเขียวบอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
งูกงคาทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
งูไซ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
งูดินมลายู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
งูทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
งูทับสมิงคลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

งูใบ้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
งูปล้องทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
งูปากกว้างน้ำเค็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
งูพังกา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง หาดเจ้าไหม
งูลายสายนลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
งูสร้อยเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกสี่ขีด
งูสิงหาคมดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
งูแสลงอาทิตย์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
งูแสมรัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
งูหลามปากเป็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เขาลำปี หาดท้ายเหมือง
งูเห่าทองพันพิษ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
จ๊กจั่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จ๊กจั่นงวงมวนแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
จ๊กจั่นทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
จิ้งจกนิ้วยาวกำพล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
จิ้งจกเขียวท้องเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
จิ้งจกหางเรียบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน-เขาสก-หาดเจ้าไหม
จิ้งจกหางแหลม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
จิ้งโจ้น้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-หมู่เกาะพยาม
จิ้งเหลนดินจุดดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
จิ้งเหลนน้อยหางยาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
จิ้งเหลนเขียวปักษ์ใต้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ฉลามวาฬ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-ธารเสด็จ- เกาะพะงัน
ชะมดแปลงลายแถบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

ชมดเผงหางคำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ชะอ้อน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ด้วงกว้างห้าเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ด้วงคืดหนองไผ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ดาวขนนก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-เขาหลัก-ลำรู่
ดาวทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ดาวเปราะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตะรุเตา
ดาวหนาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ตะพาบแก้มแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น น้ำตกสี่ขีด
ตะพาบหัวกบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ตั๊กแตนตำข้าว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ตาลปัดทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วดิด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ตุ๊กแกป่าใต้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า-ทะเลบัน
ตุ๊กแกปลายจุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
ตุ๊กแกหางเรียบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ตุ๊กตุ๋	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
เต่ากระ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
เต่าจักร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-น้ำตกสี่ขีด
เต่าทะเล	เขาปู่-เขาย่า-เขาหลวง
เต่าบึงหัวเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
เต่ามะเฟือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
เต่าสังกะสี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
เต่าหกดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
เต่าหญ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้

ถ้วยทะเล (Corallimorph)

ทาก

ตะขาบ

ทากดิน

ทากปุ่ม

นกกะจิบกระหม่อมแดง

นกกะจิบคอดำ

นกกะดีคิ้วหมู

นกกะดีคิ้วโปกขาว

นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล

นกกะทา

นกกะสาคอดำ

นกกะดีคิ้วโปกขาว

นกกะเต็น

นกกะเต็นอกขาว

นกกะเต็นอกลาย

นกกางเขนดงหางแดง

นกกาน้ำ

นกกาน้ำเล็ก

นกกาฝาก

นกกาฝากสีเลือดหมู

นกกาฝากอกเพลิง

นกกินปลา

นกกินปลีกล้วยปากยาว

นกกินปลีกล้วยเล็ก

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

หมู่เกาะเกตุรา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง-
เขาสก-สิรินธร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

หมู่เกาะพยาม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

นกกินปลีหางยางเขียว

นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล

นกขมิ้นน้อย

นกขมิ้นน้อยสีเขียว

นกขุนแผนอกสีส้ม

นกคัคคูสีทองแดง

นกเค้าป่าสีน้ำตาล

นกเงือกปากดำ

นกเงือกหัวออน

นกเงือกหัวแรด

นกเงือกหัวหงอก

นกเงือกหัวหงอน

นกจอกป่าหัวโต

นกจับแมลงคอสีน้ำตาลแดง

นกจับแมลงสีส้ม

นกจับคาหัวเขียว

นกจับดินหัวดำ

นกโจรสลัด

นกชนหิน

นกขาปีไหน

นกขาปีไหนนกยางทะเล

นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก

นกดูเหว่าผา

นกเดินดงสีเทาดำ

นกตะกรุม

นกเด้าแล้วป่าโกงกาง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตุรา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตาน้ำตกโยง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสันกาลาสีรี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ใต้ร่มเย็น

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง-เขาหลวง-บางกลาง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตุรา-หาดขนอม

หมู่เกาะทะเลใต้

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชิโป

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะระ-

เกาะพระทอง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

นกทะเลขาเขียวลายจุด
 นกนางนวล
 นกนางนวลเกลบกี้ขาว
 นกนางนวลเกลบกี้รุ้งจีน
 นกนางนวลเกลบกี้กุหลาบ
 นกในวงศ์นกยาง
 นกบั้งรอกปากแดง
 นกบั้งรอกเล็กท้องแดง
 นกปรอดหัวโขน
 นกปลีกล้วยเล็ก
 นกปากซ่อมหางเข้ม
 นกพญาปากกว้างท้องแดง
 นกพญาปากกว้างเล็ก
 นกโพระดกหลากสี
 นกยาง
 นกยางควาย
 นกยางจีน
 นกยางเปีย
 นกยางไฟหัวสีเทา
 นกลุมพูขาว
 นกแสกแดง
 นกหัว
 นกหัวขวานแดง
 นกหัวขวานแดงลาย
 นกหัวขวานสีนวลหลังทอง
 นกหัวขวานใหญ่สีดำ
 นกหัวโตนทรายเล็ก
 นกเหยี่ยวรุ้ง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่เกาะกระ เกาะพระทอง
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน-แหลมสน
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี-อ่าวพังงา
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทร่มเย็น
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
 พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

นกออก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
นกอินทรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
นกอินทรีดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลง
นกอีลุ้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง หมู่เกาะสิมิลัน
นกแอ่นกินรัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง-หมู่เกาะเภตรา
นกแอ่นฟ้าเคราขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
นกแอ่นหางสีเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
นกเลียบสัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
นกใหญ่หัวปลาคู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
บั้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
มดตะนอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลวก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลากดทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ปลากระดี่ทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลากระดี่นาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-ธารโบกขรณี
ปลากระพงแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ปลากระทุงเหวปากแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ปลากระทุงเหวเมือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก-ธารโบกขรณี
ปลากระโทงแทง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ปลากระบอกหัวลิ่ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลากระเบนจุดขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
ปลากระเบนทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ปลากระเบนราหู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
ปลากระพง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ปลากระพงแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี-หมู่เกาะระ- เกาะพระทอง
ปลากริมข้างลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

ปลากล้วย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลากะพงข้างปาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-หมู่เกาะระ- -เกาะพระทอง
ปลากะพงขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-แหลมสน
ปลากะพงแดงหางปาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลากะพงเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ปลากะรังลายขนนก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ปลากะรังลายขวางจุดน้ำเงิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ปลากะรังสายฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลากะรังหัวโขน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลากัด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
ปลาการ์ตูนส้มขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ-หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง เขาหลัก-ลำรู่
ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
ปลาเก๋หน้าแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาแกง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปลาข้างลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปลาข้างเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-แหลมสน
ปลาข้าวเม่าน้ำลึก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาจืดงเบ็ดฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ปลาจืดงเป็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาเขียวพระอินทร์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาเงะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
ปลาจะละเม็ดดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตุรา
ปลาฉลาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน-อ่าวพังงา
ปลาฉลามหูใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลาฉลามหูดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ปลาซ่อนก้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา

ปลาชะโอน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ปลาชี่ดั่งเบ็ดฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปลาชีวข้าวสารชวา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ปลาชื่อน้ำตก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลวง น้ำตกสี่ขีด
ปลาชีวใบไม้เล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
ปลาขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลาคุกงขาว หรือปลาคุกด่าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-แหลมสน
ปลาคุกลำพัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง-ตะรุเตา
ปลาตะเพียนจุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
ปลาตักแตนหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาตีน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-ลำน้ำกระบือ-หมู่เกาะพยาม
ปลาตุ๋ตู่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาทราย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-เขาหลัก-ลำรู่
ปลาทรายขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
ปลาโทง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
ปลานางฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ปลาโนรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-หมู่เกาะพยาม
ปลาในสกุลปลาตะเพียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ปลาในสกุลปลาทุ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ปลาในสกุลปลาผีเสื้อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ปลาบิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ปลาบู่อี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปลาบู๋หมาจู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปลาใบปอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ปลาใบไม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปลาปักเป้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้

ปลาปักเป้าหนามทุเรียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา-เขาหลัก-ลำรู่
ปลาปากคม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา-เขาหลัก-ลำรู่
ปลาปากแตร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ปลาแปบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปลาผีเสื้อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ปลาผีเสื้อก้างปลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาผีเสื้อคอกขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ปลาผีเสื้อเทวรูป	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาผีเสื้อลายแปดขีด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ปลาพยาบาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาพวงชมพู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง
ปลาพะพะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาหมง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ปลาหมงแซ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-สิรินาถ
ปลามังกร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปลามัด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ปลาเม่นลายเสือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ปลาโมง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาลำพัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง
ปลาเล็บมือนาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปลาวัว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาวัวหางเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปลาสลิดทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาสลิดหินบั้งหลังเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาสวขาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
ปลาซาก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-หมู่เกาะเกตุรา
ปลาสิงโต	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ปลาสิงโตปีกจุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ปลาอินสมุท	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ปลาอินสมุทลายฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปลาสิ่กุนข้างเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลาสิ่เสียด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ปลาเสือข้างลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
ปลาเสือพ่นน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลาไส้ขม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ทะเลบัน
ปลาหมูจุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปลาหมูหางแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง
ปลาหวด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ปลาหางแข็ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลาหางแข็งบั้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปลาหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-หมู่เกาะพยาม หมู่เกาะสุรินทร์
ปลาเหาฉลาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาไหลทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ปลาไหลมอเรย์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ปลาไหลมอเรย์จุดขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปลาไหลมอเรย์ปานดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปลาไหลมอเรย์ยักษ์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลาอินทรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตุรา หมู่เกาะพยาม
ปลาอีกรอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า-เขาหลวง-น้ำตกสี่ขีด
ปลาโอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตุรา
ปลาแฮะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง-น้ำตกสี่ขีด
ปลิงขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลิงเข็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ปลิงควาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ปลิงดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

ปลิงทะเลเพียงหัวหอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปลิงลูกปัด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปลิงสายสะดือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปะการัง บวมเมอแรง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปะการังกาเล็กซี่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-ตะรุเตา
ปะการังเขากวาง (Acropora sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ปะการังเขากวางขนาดใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
ปะการังเคลือบ (Encrusting coral)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หมู่เกาะชุมพร
ปะการังเคลือบหนาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปะการังจาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ตะรุเตา-หมู่เกาะสุรินทร์
ปะการังดอกกะหล่ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปะการังดอกไม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา-หาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี
ปะการังดอกไม้แปลง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ปะการังดอกเห็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-หมู่เกาะสุรินทร์
ปะการังดาวใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา-ตะรุเตา
ปะการังดำ (Black coral)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ปะการังนิ้วมือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี- หมู่เกาะพยาม
ปะการังใบไม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ปะการังแปรงล้างขวด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ปะการังผักกาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ปะการังผักกาดปะการังอ่อน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปะการังผิวถ้วยเคลือบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ปะการังแผ่นเปลวไฟหรือปะการัง ดอกจอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-หมู่เกาะสุรินทร์
ปะการังพุ่มแบบฟองน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

ปะการังฟุ่ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปะการังไฟ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-หมู่เกาะสุรินทร์
ปะการังร่องหนาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปะการังรังผึ้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปะการังรูปพวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ปะการังลูกโป่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
ปะการังสีน้ำเงิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปะการังหนาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ปักเป้าทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา-หมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะเกตุรา
ปู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ปูก้ามดาบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ตะรุเตา ลำนน้ำกระบือ
ปูดำหรือปูทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ปูแสม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ตะรุเตา หาดเจ้าไหม
ผีเสื้อกระทกรกสีคล้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ผีเสื้อกลางคืน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
ผีเสื้อขาวแครง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ผีเสื้อเจ้าป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ผีเสื้อดาราไพรปักข์ใต้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ผีเสื้อถุงทองปักข์ใต้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ผีเสื้อใบกุ่มธรรมชาติ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ผีเสื้อพอมด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ผีเสื้อแพนซีสีตาลไหม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ผีเสื้อฟ้าขาวสีต่างฤดู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ผีเสื้อมรกตธรรมชาติ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง

ผีเสื้อสายสีตาลธรรมดา

ผีเสื้อสีตาลจุดดำห้า

ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา

ผีเสื้อทองคุณธรรมดา

ผีเสื้อทองมะนาว

ผีเสื้อหางตั้ง

ผีเสื้อหางตั้งอิฐ

ผีเสื้อหางแหลม

ผีเสื้อหลวง

พญากระรอกเหลือง

พรมทะเล (Zooanthid)

ปลั้วปลิงทะเล

พะยูน (Dugong dugon)

เพรียงหัวหอม

เพ็ญพอนเหลือง

ฟองน้ำ

มดตะนอย

มวน

ม้าน้ำ

เม่นทะเล

เม่นหนามยาว

เม่นหางพวงใหญ่

เม่นใหญ่เผงคอ

เม่นใหญ่เผงคอบาว

แมงกระพรุน

แมงดาทะเล

แมงมุม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา -เขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร-สิรินธร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร-สิรินธร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร-สิรินธร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร-สิรินธร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร-สิรินธร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร-สิรินธร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร-สิรินธร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ธาร ไบภรณ์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ธาร ไบภรณ์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ธาร ไบภรณ์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ธาร ไบภรณ์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ธาร ไบภรณ์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ธาร ไบภรณ์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ธาร ไบภรณ์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ธาร ไบภรณ์

แมลงเต่าทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
แมลงปีกแข็ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
แมลงสาบทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา -เขาหลัก-ลำรู่ หมู่เกาะพยาม
แมวลายหินอ่อน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน- เขาสก
แม่หอบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
แย้จุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ลิงหางสั้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
ลิ้นทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ตะรุเตา
โลมา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
โลมาขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี -อ่าวพังงา
โลมาจุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
โลมาหัวขวด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน-หาดนพรัตน์ ธารา-หมู่เกาะพีพี
โลมาหัวขวดธรรมดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
โลมาหัวขวดมลายู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา หาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี- อ่าวพังงา
โลมาหัวบาตรคريبหลัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
วงศ์นกกระเต็น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
วงศ์นกน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
วงศ์นกช้อนหอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
วงศ์นกชายเลน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
วงศ์นกนางนวล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
วงศ์นกอีแอ่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
วาฬ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะชุมพร- หมู่เกาะสุรินทร์
แส้ทะเล (Sea whip)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-หมู่เกาะอ่างทอง

ไล่เดือน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หนอนตัวเบน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หนอนทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
หนุนาเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
หนูผีจิ๋ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
หนูฟันเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
หmann้ำหรือเขียดว้าก (<i>Rana glandulosa</i>)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
หมีเสื่อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
หมีก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน หมู่เกาะพยาม หมู่เกาะสุรินทร์
หมีกกระดอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา- ธารเสด็จ-เกาะพะงัน
หมีกสาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
หอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
หอยกะทิ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
หอยขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
หอยจี๊ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยตะโกรม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
หอยตะเภา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
หอยตาวัว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยทราย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยนางรม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
หอยเบี้ย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยเบี้ยเสือดาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
หอยเบี้ยอาร์บิก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
หอยปีกนก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยมวนพลู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยมะระ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

หอยมือผี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยมือหมี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
หอยเม่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี-หมู่เกาะพยาม
หอยเม่นหนามดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยเม่นหนามลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยร้อยรู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
หอยวงเวียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยสังข์ปีก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยสังข์หนาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
หอยเลียบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หอยหวาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
หิ่งห้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เห็บกวาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เหยี่ยวผึ้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
เห่าช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
อีแปะทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อีเห็นธรรมดา บ้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อีเห็นลายพาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
อีงกรายมลายู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
อีงกรายลายจุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
อีงกรายหัวมน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
อีงกรายหัวแหลม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ไฮดรอยด์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

กบ

จิ้งจกหางแบน

นกเขาใหญ่

กบนา	จิ้งจกหางหนาม	นกกลุ่มอกลาย
กบบัว	จิ้งเหลน	นกเงือก
กระจง	จิ้งเหลนบ้าน	นกเงือกกรามช้าง
กระจ๊อน	จิ้งเหลนหลากหลาย	นกแซงแซว
กระแต	ชะนี	นกแซงแซวหางปลา
กระตัง	ชะมด	นกคู้เหว่า
กระรอก	ช้างป่า	นกเค้าดินทุ่ง
กวางป่า	ตะกวด	นกเค้าลมหลังเทา
กิ้งก่า	ตุ๊กแก	นกตะขาบทุ่ง
กิ้งก่าบินปีกส้ม	ตุ๊กแกบ้าน	นกตีทอง
กิ้งก่าสวน	เต่าเหลือง	นกนางแอ่นบ้าน
กิ้งก่าหัวแดง	นกกก	นกบั้งรอกใหญ่
แก้ง	นกกระปูด	นกปรอดทอง
ไก่อู	นกกวัก	นกปรอดเหลืองหัวจุก
ไก่อูฟ้า	นกยางเขนดง	นกพญาไฟ
เขียด	นกยางเขนบ้าน	นกโพระดก
ค้าง	นกกินปลือกเหลือง	นกยางเขียว
คางคก	นกแก๊ก	นกหัวขวาน
คางคกบ้าน	นกขมิ้น	นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง
ค้างคาว	นกขุนทอง	บ่าง
งู	นกเขา	ปลา
งูเขียวดอกหมาก	นกเขาเขียว	ปลากระตัง
งูจงอาง	นกเขาเป๋ล้า	ปลาก้าง
งูเหลือม	นกเขาเป๋ล้าธรรมดา	ปลาช่อน
ปลาชิว	แมวป่า	หนูท้องขาว
ปลาตุ๊ก	แย้	หมาใน
ปลาตะเพียน	ลิง	หมาไม้
ปลาตะเพียนขาว	ลิงกัง	หมี

ปลาบู๋	ลั่น	หมึกน
ปลาหมอ	เลียงผา	หมึกวาย
ปลาไหล	วัวแดง	หมึกหมา
ปาด	เสื่อ	หมูป่า
ปาดบ้าน	เสื่อโคร่ง	หมูหริ่ง
พังพอน	เสื่อปลา	เหยี่ยว
เม่น	เสื่อไฟ	เหยี่ยวขาว
เม่นหางพวง	หนู	อีกา
อีเห็น	อึ่งข้างดำ	อึ่งอ่าง
อีเห็นข้างลาย	อึ่งน้ำเต้า	อึ่งอ่างบ้าน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

ยกเว้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ

กบอ่อง	นกนางแอ่น	ปลาสร้อยนกเขา
เจียดตะปาด	นกปรอด	ปลาหมอไทย
งูสิงธรรมชาติ	นกเอี้ยงสาริกา	พญากระรอกดำ
นกกระเตแต้แต้แว๊ด	ปลากระทิงดำ	พังพอนธรรมดา
นกจาบดินอกลาย		

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

ยกเว้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก

กบหนอง	นกกินปลี	นกพญาไฟใหญ่
แก้ง	นกแก้ว	นกยูง
ชะมดเผงสันหางดำ	นกเค้าคู่	นึ่งหรือลั่น
ตุ๋น	นกจับแมลงหัวเทา	ปลาอีสก
นก	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่	ผีเสื้อ
นกกระปูดใหญ่	นกแต้วแร้ว	เหยี่ยวรุ้ง
นกกาเหว่า		

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

ยกเว้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กบทุก	นกนางแอ่น	ปลาพลวง
กระเจงเก็ก	นกกาฮัง	ปลาสาคร
กระเจงหนู	นกขมิ้นท้ายทอยดำ	ปลาหลด
กระแตธรรมดา	นกขมิ้นน้อยสวน	ปูน้ำตก
กระรอกท้องแดง	นกเขี้ยวคราม	แมวดาว
กระรอกปลายหางดำ	นกจาบคาหัวสีส้ม	ลิงแสม
เขียดบัว	นกเด้าดิน	ลิงชวา
คางคกเกราะ	นกปรอดคอกลาย	สมเสร็จ
คางคกเล็ก	นกอีวาบตั๊กแตน	เสือดาว
งูกะปะ	นกเอี้ยง	เสือลายเมฆ
งูหลาม	นากเล็กเล็บสั้น	หนูฟันเหลือง
งูโคร่ง	นางอาย หรือลิงลม	หอยขม
ชะนีธรรมดา	ปลาเก็ด	หอยโข่ง
ชะมดเช็ด	ปลาแขยงหิน	หอยเจดีย์
ตะพาบน้ำ	ปลาชะโด	เหี้ย
เต่า	ปลาชิวใบไผ่	อีกราย
เต่าหก	ปลาติดหิน	ปลานิล
เต่าหัว		

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

ยกเว้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้

กระต่ายป่า	ค้างแว่นถิ่นเหนือ	นกปรอดหัวสีเขม่า
กระแตเหนือ	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว	นกหกเล็กปากแดง
กระรอกบิน	งูสามเหลี่ยม	นกแอ่นตาล
กระรอกหลากสี	งูเห่า	นกฮูก

กวาง	จิ้งจกดินลายจุด	เป็ดแดง
กิ้งกือ	นกกะทาทุ่ง	ลิงลมหรือนางอาย
ไก่อฟ้าพญาลอ	นกกะแรงหัวขวาน	สุนัขจิ้งจอก
ไก่อฟ้าหลังขาว	นกกินแมลงอกเหลือง	หนูหริ่ง
เจียดจะนา	นกเค้าแมว	หมาจิ้งจอก
เจียดหนอง	นกแซงแซวหางอกขน	อ้น
เจียดอ่อง	นกปรอดก้นแดง	อ้นเล็ก
ค้างคาวขอบหูขาวกลาง	นกปรอดสวน	

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือและภาคใต้

กบว้าก	นกคุ้ม	ปลารากกล้วย
กระเล็น	นกเค้าลมเหลือง	ปลาเลียหินหรือปลาติดดิน
ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล	นกตบยุงหางยาว	ปลาสร้อย
งูเขียวหัวจิ้งจก	นกเป็ดน้ำ	ปลาหัวตะกั่ว
งูลายสอธรรมดา	นกพญาปากกว้าง	ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
งูลายสอสวน	นกยางกรอกพันธุ์จีน	พังพอนกินปู
งูลายสอใหญ่	นาก	สัตว์เลื้อยคลาน
งูสิงบ้าน	ปลาชิวควย	หนูเกาะ
ชะมดแผงหางปล้อง	ปลาตุ๊กตุย	หมีขอ
เต่าหวาย	ปลาเนื้ออ่อน	อ้นใหญ่
นกกงเขนดง	อีกรายลายเลอะ	

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกและภาคใต้

กบน้ำเค็มหรือกบน้ำกร่อย	นกนางแอ่นกินรัง	ปลาเห็ดโคน
กบภูเขา	นกนางแอ่นแปซิฟิก	ปลาอมไข่
กัลปังหา (Sea Fan)	นกบั้งรอกแดง	ปลิงทะเล
กิ้งก่าแก้ว	นกโพระดกสวน	ปะการัง
กิ้ง	นกยางทะเล	ปลากระต๊อบ

กุ้งแชบ๊วย	นกอีเสือสีน้ำตาล	ปะการังโต๊ะ
กุ้งหม้อ	นกเอี้ยงดำ	ปะการังถ้วยส้ม
เขียดจิก	นกแอ่นบ้าน	ปะการังพุ่มไม้
ค้างคาวมงกุฏ	ปลากระดี่หม้อ	ปะการังสมอง
ค้างคาวแม่ไก่เกาะ	ปลากระทุงเหว	ปะการังเห็ด
ค้างแว่นถิ่นใต้	ปลากระบอก	ปะการังอ่อน (Soft coral)
งูเขียว	งูเห่าทะเล	ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphrsa sirinthorn)
งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	ปลาเกะดัก	ปะการังโขดหรือปะการังนิ้วมือ (Porites lutea)
ปูม้า	ปลาเกะพง	ปูลม
จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ	ปลาเกะรัง	ปูเสฉวน
ชะนีมือขาว	ปลาการ์ตูน	ปูหิน
ดอกไม้ทะเล	ปลาเก๋า	พังพอนเล็ก
เต่าดำ	ปลาตะกรับ	แมลงปอ
เต่าตนุ	ปลาทุ	ลิงเสน
เต่านา	ปลานกแก้ว	โลมาหัวบาตร
นกกระทาดง	ปลานกขุนทอง	เสือดำ
นกกระปูดเล็ก	ปลาโนรีครีบยาว	หมึกกล้วย
นกกระเต็นแดง	ปลาปากใต้	หอยตลับ
นกเงือกกรามช้างปากเรียบ	ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น	หอยเต้าปูน
นกแซงแซวปากกา	ปลาสิลิดหิน	หอยทับทิม
นกตบยุง	ปลาสิกัน	หอยนมสาว
นกตะขาบแดง	ปลาหนามหลัง	หอยมือเสือ
หอยแมลงภู่	อีเห็นธรรมดา	อึ่งหลังจุด

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

กบหลังขีด	นาทไหญ่ขนิเรียบ	ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา
กระรอกบินแก้มสีแดง	ปลากระดี่เหลือง	พญากระรอก

จิ้งจก	ปลากริม	แลน
นกเขาชวา	ปลาแก้มขี้	เหยี่ยวแดง
นกเขาหลวง	ปลาแขยงใบขาว	อึ่งลายเต็ม
ปลาสลิด	นกเค้าลมดง	ปลาตูลานา หรือปลาไหลหูดำ
ปลาหมอเทศ		

พบเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือและภาคกลาง

กบห้วยสีข้างดำ	นกขมิ้นน้อยธรรมดา	ปลาค้อ
กระเรียนขนปลายหูสั้น	นกขุนแผนหัวแดง	ปลาจาด
กิ้งก่าบ้าน	นกเขียวก้านทองปีกสีฟ้า	ปลาชีวกายแถบดำ
กิ้งก่าบิน	นกจับแมลงจุกดำ	ปลาตะโกก
เขียดหลังเขียว	นกจาบคาเล็ก	ปลาตะเพียนน้ำตก
ค้างคาวเล็บงูด	นกแซงแซวหางบ่วง	ปลาพลวงหิน
ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกรรณ	นกไต่ไม้หน้าผากดำมะหยี่	ปลาแรด
ค้างคาวงอก	นกพญาปากกว้างอกสีเงิน	ปลาเวียน
งูเขียวหัวจิ้งจกป่า	นกยูงไทย	ปลาสร้อยขาว
งูทางมะพร้าวลายขีด	นกแว่นสีเทา	ปลาตายพื้นเมืองเหนือ
งูลายสาคอแดง	นกสีชมพูสวน	เม่นใหญ่
งูสิง	นกหัวขวานเขียวป่าไผ่	เม่นใหญ่เผงคอสั้น
ตุ๊กแกป่า	นกหัวขวานด่างแคะ	เหยี่ยวนกเขา
เต่าใบไม้	นากใหญ่	อึ่งขาคำ
นกกะปูด	ปลากั้ง	ปลาแขยง
นกกระรางหัวหงอก	ปลาขาว	

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไกฟ้าหลังเทา	นกเงือกสีน้ำตาล	ปลาอีด
ตะขาบ	นกโพระดกธรรมดา	ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่
นกกระเจี๊ยบสวน	ปลากระสูบ	พญากระรอกบินหูแดง

นกระเด็นธรรมดา	ปลากระสุนจุด	เหยี่ยวนกเขาชิดรา
นกระรางหัวหงอก	ปลากลาย	อีเก้งหรือฟาน
นกกิ้งโครงคอดำ	ปลาชอนทราย	อึ่งอืดหนังลาย
นกแขกเต้า	ปลาตะเพียนทราย	ปลาหมอช้างเหยียบ
นกแขวก		

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระต่าย	นกขุนแผน	นกพญาไฟสีกุหลาบ
กระต้าง	นกเขนน้อยปีกแถบขาว	นกโพระดกคอสีฟ้า
ค้างคาวปากย่น	นกเขาไฟ	นกยอดหญ้าหัวดำ
งูเขียวหางไหม้	นกคุ้มอืด	ปลากระสุน
เต่าदीอย	นกเค้าโมง	ปลาแซ่
เต่าปูลู	นกจับแมลงคอแดง	ปลาฉิวหนวดขาว
นกระจิบ	นกแซงแซวสีเทา	ปาดกระ
นกกินแมลง	นกเป็ดผีเล็ก	ลิงวอก
นกจี๊ดไผ่ใหญ่	นกเป็ดธรรมดา	อึ่งอ่างก้นจืด

ภาคเหนือ ได้แก่

กิ้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
กระเจาะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผาแดง
กระเจียวแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
กระเจียวป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
กระซาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน-ลำน้ำกก-นันทบุรี
กระเช้าสีดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
กระโดนสร้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
กระโถนฤๅษี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-ดอยภูคา
กระต้อน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน-อยขุนตาล
กระต้อมหมู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า-ขุนสถาน
กระต้อนน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย

กระทุ่มบก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
กระบากใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
กระเบา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
กล้วย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
กล้วยคงคำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
กล้วยนวล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
กล้วยไม้รองเท้านารี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขาน
กล้วยฤาษี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-น้ำตกแม่สุรินทร์-แม่ วงค์
ก้าม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ก้ามภูคา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ก่อกระดุม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ก่อกำด้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ก่อกำยาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
ก่อขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ก่อข้าว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ก่อดาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ก่อแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ
ก่อตลับ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ก่อตาหมูน้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ก่อตาหมูหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-น้ำหนาว
ก่อใบเลื่อม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า-ดอยอินทนนท์-แม่วงค์-น้ำตกแม่ สุรินทร์
ก่อพวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา-ลำน้ำกก
ก่อลิ้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-แม่วงค์
ก่อเลือด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ก่อสีเสียด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ก่อหม่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ก่อหมาก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ก่อหุยม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ก่อหัวหมู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล-ภูหินร่องกล้า
ก่อหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ก่อแอบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-แม่วังก์
กะเพราคั่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วังก์
กะลั่งต้งช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
กำมปู้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
กายอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
กำวเครือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
กาหลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
กำลั่งช้างสาร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ก๊ิบเรด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
กุ๊ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง-ห้วยน้ำดัง
กุง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
กุหลาบขาวเชียงควา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
กุหลาบพันปีสีแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
กุหลาบหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก-นันทบุรี
กูดดอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
กูดตัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย-ถ้ำสะเก็น
เก็ดดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ
เกล็ดปลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
แกง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ไก่อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ไก่อแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ขมื่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ขมื่นแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ขมื่นป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ขางครั้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ข่าลิ่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท์-แม่วังก์
ขาวละมุน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ข้าวสารป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

จิงป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
เจิงแข่งม้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
เจิงช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
เจื่อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
เจื่องแข่งม้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง-ศรีลำนานา-ขุนสถาน
แข่งกวาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง-ศรีลำนานา-คอยขุนตาล-คอยสุเทพ-ปุย
แจมหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ไชน่กุ่ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ไชน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี
คนทา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
คนางใบหยก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
คราม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ครามป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ค้อเชียงดาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
คัดเค้าเครือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
คัดเค้าภูคา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ค่าหุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า-แม่วง
ค่าไก่ มะไฟ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ค่าขาวหรือกุหลาบพันปี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
สีขาว	
ค่าแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์-ลำน้ำกก
เก็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง-ห้วยน้ำดัง
เครือข้างครั่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนานา
เครืองูเห่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
เครือเดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนานา
เครือด้วย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ
เครือนมวัว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนานา
เครือพันช้าย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนานา
เครือไหล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนานา

เกาะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
แคทรายงัวป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
แคหัวหมู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
โคลงเคลงขน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี-ลำน้ำกก
ไคร้ขน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ไคร้มด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
จอกหูหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
จอแจ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
จันทร์ทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
จำปี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน-แม่ตะไคร้
จำปีหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-ดอยอินทนนท์
จุกนารี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ชมพู่ฤๅ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ช้องนางคลี่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ช้างกระ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ชำล้าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
โชนผี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
โชนใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
เผ่าหลังลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ดอกกุง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ดอกขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
ดอกมะขาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ดอกหงอนนาค	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
คาดตะกั่ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ดาวราย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
เดือปล่องหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
แดงตะแบก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง (เขียงดาว)
แดงน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดากสินมหาราช-ออบขาน
ต้นโพสามหาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ตระคร้อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองตรอน

ตองลาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ตองสาต	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
ตองหอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ตะคร้าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ
ตะไคร้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตะไคร้ต้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน-ห้วยน้ำดัง
ตับเต่าต้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง-น้ำตกแม่สุรินทร์
ต่างไก่อปา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์-ห้วยน้ำดัง
ตาลี่เคย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ตาลเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ดำเข้ต้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ดำเสาหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ดุ่มกั่วว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
เต็งดานี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
เต็งรัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองตรอน -น้ำตกพาเจริญ
เดิม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน-แม่โถ
ถั่วระแป	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ
เถยยังดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ทีเฟิร์น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เท้าสิงห์โต	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยหลวง
เทียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
เทียนคอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ไทรย้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
นมนาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
นมวัวคอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
นางพญาเสือโคร่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
บอนเต่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
บอนป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
บันดงเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
บัวตอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

บัวทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
บุกกางคก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ประดับหินดาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ประดู่ตะเฒ่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยขุนตาล
ประดู่ส้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
ประดือน้อยภูคา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ปอกระสา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ปอดูปหูช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-คลองวังเจ้า
ปอหยาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง-ศรีลานนา-รามคำแหง
ปอสลักพาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ปอตำโรง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปัดแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ปาล์มขนาดใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ปู้เจ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เป้งเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยขุนตาล
ผักเบี้ยดิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ผักเป็ดไทย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
ผักแว่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ผักหนอกคอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
ไผ่ขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยหลวง
ไผ่โจด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ
ไผ่บงดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ไผ่บงป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ไผ่แวก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง (เชียงใหม่)
ไผ่ศก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน-ขุนน้ำ
ไผ่สีสุก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ฝอยลม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
ฝาละมี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
พญาแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์-ห้วยน้ำดัง
พญาเสือโคร่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

พริกไทย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
พลวงตะเคียนหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
พลับพลายช่อหนาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
พลูช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
พลูดิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ
พวงมาลัย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
พ่อคำดีเมีย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-ศรีลำนนา
แพงพวยน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ไพล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ฟ้ามุย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
มณฑา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
มณฑาดอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
มณฑาหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ม่วงก้อม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
มะเกลือเลือด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยขุนตาล
มะขามแป	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนนา
มะเดื่อหอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วังก์
มะตาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนนา
มะนาวควาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วังก์
มะเฟืองช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
มะมือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
มะมุ่นดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
มะยมป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน-ดอยภูนาง-ดอยภูนาง
มะลิหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
มะลิ้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
มะห้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนนา
มะแฮะนก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลำนนา-รามคำแหง
มันดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
มันดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
มันปลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-รามคำแหง-ศรีลำนนา

ม้ากระต๊อบโรง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ม้าสามต้อน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-คอยสุเทพ-ปุย
เมื่อดูนตัวผู้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
เม่นเล็กหางพวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
เมี่ยงคอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
เมี่ยงหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
โมก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ไม้กระพี้เขาควาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยผากลอง
ไม้แดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยผากลอง
ไม้ประดู่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยผากลอง
ไม้มะค่าโมง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยผากลอง
ไมยราบเครือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วังก์
ไมยราบต้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วังก์
ไม้ยาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
ไม้วงศ์ก่อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
ไม้สนเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูนาง
ไม้สนเขาหรือเกี๊ยะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ไม้สัก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยผากลอง
ยาแก้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ยางโดน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ยางเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ยาบจีไก่อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
รักขน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
รางจืดต้นภูคา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ลดาวัดย์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
ลำไยป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
ลำไยป่าเครือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ลิเกา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
เลียงมัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูนาง
เลือดควายใบใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา-รามคำแหง

โอดทะนงเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ว่านนกคุ้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ว่านมหากาฬ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ว่านมหาเมฆ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
วาสุกรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
สน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
สนเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อน้ำตกพาเจริญ
สนสามใบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ
ส้มกั้ง	พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี
ส้มปี้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
สลักป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย
สลีนก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-แม่วาง-คอยอินทนนท์
สะแก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
สะพานหินธรรมชาติ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
สักไผ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
สาบหมา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์-แจ้ซ้อน-แม่โถ
สาสีหนุ่ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
สาหร่ายหางกระรอก	พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี
สำเภแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
สิงโตสยามฯ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
สีเสียดเหนือ	พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี
เสลาดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
เส้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
เสี้ยวป่าดอกขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
โสมขบา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
หญ้ากาบไผ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
หญ้ากาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
หญ้าขัด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
หญ้าเขมน้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
หญ้าคาหญ้าปากควาย	พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี

หญ้าดอกคำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
หญ้าถอบ้อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
หญ้าน้ำหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
หญ้าใบไฟ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย
หญ้าแฝก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน-คอยอินทนนท์
หญ้าแพรงหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
หญ้าสองปล้อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
หญ้าสาบเสือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
หญ้าหนวดฤๅษี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
หญ้าหนวดฤๅษีเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
หญ้าเหหัวหมู	พบในพื้นที่อุทยานชาตินันทบุรี
หญ้านกคุ้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
หนอนจืดวาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
หนาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์-แจ้ซ้อน
หนาดเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
หนาดคำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-ศรีลานนา
หนามเก็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
หนามปุย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
หมักอินทร์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
หมากเต้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ
หมากป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
หมี่ปิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
หมี่เหม็น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์-ศรีน่าน
หยั่งสมุทร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
หว่าดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
หว่ายนิ้ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
หว่ายป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยหลวง
หว่ายโป่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
หว่ายไส้ไก่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
หางกระรอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

เห้งน้ำทิพย์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
เห็ดขมึ้นน้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เห็ดขมึ้นใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เห็ดขอนแก่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เห็ดไข่ห่านเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เห็ดจั่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เห็ดขวาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เห็ดแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เห็ดมัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เหมีอดคนตัวผู้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์-คอยอินทนนท์-แม่วาง
เหมีอดคง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
เหมีอดปลาชิว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
เหมีอดหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง-คอยอินทนนท์
เหมีอดแอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
เหลืองละมุน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยภูคา
ແຫລບ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์
ແຫລບຸກ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยขุนตาล
อบเชยเถา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อวบน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ออสมันดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์-ห้วยน้ำดัง
อำหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
เอ็นอำคอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
เอื้องขี้หมา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
เอื้องช้างกระ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยสุเทพ-ปุย-คอยอินทนนท์
เอื้องแซะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์-น้ำตกแม่สุรินทร์-คอยสุเทพ-ปุย
เอื้องดิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
เอื้องดาหีน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
เอื้องผา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
เอื้องมณีไตรรงค์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขาน
เอื้องมะขาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคอยอินทนนท์

เอื้องม้าวี่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
เอื้องสาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
เอื้องสายสามสี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ได้แก่

กก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
กกรงกา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
กกสามเหลี่ยม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
กรวยป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ-ไทรโยค
กระชิด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี-แก่งกระจาน
กระเช้าฝีมด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
กระดังใบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
กระถินณรงค์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
กระทิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด-น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
กระบกกรัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ-น้ำตกพลี
กระปอกเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
กล้วยไม้สกุลเข็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
กะพี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
กะระกะร้อน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์-น้ำตกพลี
กัลลังกาสาวผู้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
กำลัษหนูมาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
กุ่มน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
กุศเขากวาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
กุศห้อม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
กุศอ้อม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
แก้วผา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ไก่อีเขี้ยว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ขนาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง-หาดวนกร
ขนาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ-ไทรโยค
ข้าวเย็นเหนือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

ข้าวสารหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
ชิงช้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา-ลำคลองงู
เข็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เข็มดอกใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
ไข่น้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
ไข่มุก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
กานหามเสือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
กูด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
เกด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
เครือมัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
ไคร้หน้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
ไคร้ย่อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
หมอนดีหมา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
จอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
จัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จันทน์ชะมด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
จามจุรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
จิงจ้อน้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
จุก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เจ็ดช้างสาร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
ชกเหลืองจันท	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
ชะคราม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ชะอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ชะโอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
ชันใบใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ชุมแพรง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
ดิลิน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
แดงดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ดอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
ตะขบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ตะแบกกราย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
ตะแบกใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
ตาคุ่มบก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ตาลปัตรฤๅษี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
คำแยกวาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ดินตุ๊กแก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
ถอบแถบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ถั่วแปบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
เถากระไดลิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เถาคัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว
เถาถอบแถบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
เถาย่านาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
เถาวักระทงลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เถาอบเชย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ทะลายเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด-กุยบุรี
ทุเรียนป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
นมเมีย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เนียนดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ-เขาชะเมา-เขาวง
เนียมฤๅษี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
บัวสาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด-น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
บัวหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ประดู่เลือด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ปีป	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
ปูดใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว
เปราะหอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เปล้าน้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
ผักตบไทย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ผักเบี้ย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ผักเป็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ไผ่กาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

ไผ่คาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
ไผ่สี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว
ไผ่นวล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
ไผ่หางช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
ฝาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
พญาปล้องทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว
พนอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว-น้ำตกพลิว
พลองดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
พลองใบเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
พลองใบใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
พลับ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง-เขาคิชฌกูฏ
พืชมะนาวป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
พุงทะลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว
มะขาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
มะคูก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
มะนาวป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
มะพลับดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
มะเฒ่าไข่ปลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
มะลิไส้ไก่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
มะฮอกกานี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
โมกขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
โมกเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ยางโอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ-ไทรโยค
ยูคาลิปตัส	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
รง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ก่อเดือย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
เร่วป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว
ละอองไฟฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
ลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
หว่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ลูกคิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ-เขาแหลม
เล็บแมว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ว่านเศรษฐี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ส้มกุ้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
สมอ ตะเคียนหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
สะแกวัลย์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน-เฉลิมรัตน โกสินทร์
สะเดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
สะเดาป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
สันตะวา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
สามร้อยยอด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
สารภี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ลำรอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว-เขาคิชฌกูฏ
สีเสียดแก่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
แสงพันเภา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว
โสกเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
หงอนไก่แดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หญ้าขม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หญ้าข้าวป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
หญ้าคมบางเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
หญ้าไซ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หญ้าเทียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
หญ้าปราบน้ำเค็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หญ้าปล้อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หญ้าหางเสือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
หนวดฤาษี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
หนามเกี่ยวไก่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร-เฉลิมรัตน โกสินทร์
หนามจีแรด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง-เฉลิมรัตนโกสินทร์- ไทรโยค
หนามเก็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
หนามมะเก็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

หมากเล็กหมากน้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หย่อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ห้วยลัก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
หาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
เหมือดแก้ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
เหมือดโสด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
เหลื่องจันทบูร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลี
แหน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
แห้วทรงกระเทียม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
โหรินิ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อินทรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
เอื้องกระเรกระร่อน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
เอื้องกุหลาบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เอื้องเข็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เอื้องปากเป็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
เอื้องมัจฉา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลี
เอื้องมัลลยา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

กระทงลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
กล้วยไม้แดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
กล้วยไม้ตระกูลหวาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแล้งคา
แดงอุบล	
ก่อหนาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ก่อหมู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
กะเบาหลัก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กะปิเขาควาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
กะอวม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
ก้านเหลื่อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
กำลังกาสาตัวผู้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กุหลาบป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ
กุศเคียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
กุศอดแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กุศดินขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กุศปัด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เก็ดล้าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แกนมอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แกแล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
แก้ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
แก้วมือไว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
แก้วหาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแล่นคา
ขนนกยูง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ขมิ้น โศก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ข่อยหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ข้าวก่านกยูง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เข็มแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
โชนผี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โชนใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ก้อดอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
กางสู่่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
เครือเขาน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
จันผา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
จำฮ่อม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ชัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
ช้างน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-ภูพาน
ซาก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แซม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
ดอกดิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ดอกหรีด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ดาวเรืองภู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก-ภูกระดึง

แดงอุบล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ตลงเตบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตะโกหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
ตั้งไก่อ(หัวไก่อือก)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ค้างผา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ค้างหุขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก
ดินตั้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-ภูพาน
ดินเปิดเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาคลี
เถาเมฆขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เทียนภู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
นกคุ้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นางคำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-ภูพาน
นางนวล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาคลี
นางอ้ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
น้ำเต้าพระฤาษี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เนียมดอกธูป	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก
บรมี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
บุกใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ใบก้นปิด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ปรก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ปอขนาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาคลี
ปอแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ปอหุ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน-เขาใหญ่
ปู่จ้าว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
เปราะภู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ผักหวานป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ไผ่ซางหม่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก
ไผ่ลั่นทม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไผ่หลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ไผ่หวานบ้าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

แฝก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
พุง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
พวงคัมพู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
พวงประดิมฐ์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
พะดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พีพ่าย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแล่นคา
เพ็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
เพลางังหัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เฟิร์นกระเช้าสีดา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินาญ-น้ำโสม
เฟิร์นแผง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
มณีเทวา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
มะกอกเลื่อม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน-ภูกระดึง
มะเกลือกา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
มะเขือเถื่อน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
มะพร้าว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มะพอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง-ภูพาน
มะลิป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
มือพระนารายณ์	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ไม้กระยา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแล่นคา
ไม้เหียง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ยางกราด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ยางควน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ย่านหูเสือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
รักทะนง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
รางจืด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
ลำควน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
ลูกไม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ-ดาดโตน-ภูพาน
ว่านคางคก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
สนทราย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ส้มแปะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก-เขาใหญ่-ภูกระดึง

สร้อยอินทนิล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
สองสลิ้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สะแกแสง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
สะเม็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ล้านเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
สาปเสื่อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
สามปอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ
เสี้ยน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแล่นคา
แสนคำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
โศภา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
หญ้าขนตาช้างเถา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หญ้าข้าวกำขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
หญ้าแซม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หญ้าพง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หญ้าหัวเสือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หญ้าเหลื่อม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
หนามไผ่ปู้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
หนามคณฑา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก
หมักม่อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
หมากมุย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
หมากลิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หยาดน้ำค้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
หลวงข้าวาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หวานไพร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
หวายเขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดโตน
หางเสือลาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
เหมือดคนดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เหลืองพิสมร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
แห้วกระต่าย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อินทนิลบก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

เอ็นแอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เอื้องเขาเกละ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
เอื้องเงิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ไอยเรศ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ฮอมคำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ภาคใต้ ได้แก่

กล้วยไม้หน้ารีช่อง อ่างทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ก่อเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง-น้ำตกสี่ขีด
ก่อใบเอียง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
ก่อเรียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
ก่อเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น-น้ำตกสี่ขีด
กะทกรก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
กะทือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
กะเบาถึง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
กะลอนข	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น-น้ำตกสี่ขีด
กะลุมพี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ก้างปลาทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ก้านตอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
กาฝาก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
กาลอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว -บูโด-สุไหงปาดี
กาหยี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตุรา
กุ่มขี้ทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
กุหลาบเขาหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
กูดขม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
กูดจ้อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
กูดปรัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
กูดหางค่าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
กูดหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

แกงเลียงใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
แก้วนํ้าม้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-ตะรุเตา
โกกงาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-ทะเลบัน-หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
โกกงางหัวส้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โกกงางหูช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-เขาหลัก-ลำรู่-ตะรุเตา
โกมาซุม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
ไก่อัดม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ไกรทองหรือพิรุณทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ขนดาสังโต	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ขนหนอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ขนุนนก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ขนุนปาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน-น้ำตกโยง
ขมัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ขันทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ขาเปี้ย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
จีไก่อ่าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จีแรด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
จีหนอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
จีเหล็กย่าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ขุนไม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
เข้มน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เข้มทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
เข้มพระรามไม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ไข่เขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
คล้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
คลุ้ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
คอกิ้ว่าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
คอแห้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
คัดเค้าทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
คัดเค้าหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน

คันทร่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
คันหามเสือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
คุยช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
เคย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
เคลง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
เคลงหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
เค	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
เคฝอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตุรา
โคลงเคลง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง-สิรินาถ
โคลงเคลงขึ้นก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
งวงช้างทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
เงาะป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
จวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
จันทร์คันทนา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
จำปา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
จำปูนช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
จิกเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
จิกทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
จิกนา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จิกน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จิกเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
จิ้งจ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
เจียด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
ฉก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ไฉน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตุรา
ชก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด - ใต้ร่มเย็น
ชมัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
ชะมวงป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ชะมัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
ชะเมา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง

ชะเอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ชันยอค	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ชันรุจิ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ช้างร้องไห้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ช้างไห้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-อ่าวมะนาว-เขาดันหยง
ชิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ชิงชี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ชุมเห็ด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ชุมเห็ดเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ชะะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-ทะเลบัน
ดาวสามแฉก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
ดาหลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง
คำตะโก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
แดงเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง-น้ำตกสี่ขีด
แดงคาน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ต้นมะนาวผี (Atalantia monophylla)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง
ดอกใบใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ทองแตบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ตะขบควาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ตะเข็บ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ตะเคียนชันตาแมว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก-คลองพนม-เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ตะเคียนทราย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ตะเคียนราก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ตะบูนขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ตะบูนขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ตะพวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
คำเสา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ดิ่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
ดิ่งดั่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

ดินเป็ดแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
ดินเป็ดพรุ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง
ดินเป็ดเล็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เคยเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
เคยชะครู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เคยหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-แหลมสน-หมู่เกาะสุรินทร์
เต้าร้างแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
แดงซ่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ถอบแถบเครือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ถั่วคล้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ถั่วทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ถั่วผี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
เถากระเพาะปลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
เถาางรอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เถาปล่อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เถาไฟ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
เถาวัลย์ด้วน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ทองบั้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง
ทัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง
ทังใบใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง
ทังฟ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
เทพทาโร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
เท้าแสนปม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เทียนนา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ไทรย้อยใบทู่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
นน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน-หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
นมพิจิตร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
นวล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
นากบุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี -คลองพนม
นากบุดร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้

นาคราช	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
นระพูลีไทย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
เนียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน-หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี น้ำตกสี่ขีด
เนียมนกเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
บัวแกลใบมน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
บัวแกลใบใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
บัวผุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก-เขาสก-น้ำตกหงาว-บางกลาง
บัวสาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
भाग	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
บุกหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
บุญนาถเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ใบไม้สีทอง หรือ ย่านดาโอ๊ะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางกลาง-บูโด-สุไหงปาดี
ปรงเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-ตะรุเตา
ปรงทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ปรงหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ประลัก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ปลาไหลเผือก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ปอเต่าไห้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ปอฝาสาม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ปอหู่ช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด -ได้ร่มเย็น
ปาล์มเจ้าเมืองถลาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปาล์มช้างไห้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ปาล์มบังสุรย์ หรือลีแป	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางกลาง-บูโด-สุไหงปาดี
ปาหนันช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ปุด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก-บางกลาง-เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
เป็งทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง- หาดเจ้าไหม
เปรียงขานาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

เปล้าน้ำเงิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เปื่อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
โปรง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกดรา-หาดเจ้าไหม-ตะรุเตา- ลำนาคะบุรี
โปรงทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ผักขี้เขียด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ผักแขยง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ผักนึ่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-ทะเลบัน
ผักขอดทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ผักราด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ไผ่เกรียบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ไผ่เถียงรูน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม
ไผ่เรียบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ไผ่หลอด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ฝาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-อ่าวพังงา
ฝาดดอกขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ฝาดแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-สิรินาถ
ฝาดดอกแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
พริกไทยป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
พลองตาเปิด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
พลองใบมน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
พลองใบใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน-หาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้
พลับเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
พลับพลึง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้-ตะรุเตา หมู่เกาะอ่างทอง
ปลา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
พลูฉีก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
พะยอมทราย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
พังกา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

พังกาหัวสุมดอกขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
พังกาหัวสุมดอกแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-เขาหลัก-ลำรู่
พังแหร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
พังแหรใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน-น้ำตกสี่ขีด -ได้ร่มเย็น
พิกุล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
พิกุลป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
พุดน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
พุทราทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เพลงกัศตอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
โพกริ่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-หมู่เกาะสุรินทร์
ไพลดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เฟิร์นก้ามปู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
เฟิร์นข้าหลวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
เฟิร์นต้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง
เฟิร์นดินตะขบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
เฟิร์นราชินี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ไฟกา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
มะคะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-อ่าวมะนาว-เขาดันหยง
มะเคือขึ้นก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
มะเคือป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
มะปริง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง-หมู่เกาะสิมิลัน
มะพลับพรุ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
มะเฝ้าคง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะสุรินทร์
มะขง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
มะหวด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน-หมู่เกาะสิมิลัน
มะหาดรุม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
มังคะ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม-เขาน้ำค้าง-ลำน้ำกระบุรี
มังตาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
มังเส	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
มันเทียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

มูกเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
แม่กลอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โมกแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
โมกป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ไม้โกงกาง (Rhizophora sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
ไม้ตะบูน (Xylocarpus sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
ไม้ถั่วและไม้พังกาหัว ส้ม (Bruguiera sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
ไม้เท้ายันยาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ไม้โปรง (Ceriop sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
ไม้ฝาด (Lumnitzera sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
ไม้ยวนแหล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม
ไม้ลำพูทะเล (Sonneratia sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
ไม้ลำแพน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ไม้เสม็ดขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง
ไม้แสม (Avicennia sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
ไม้หอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ไม้เหजीอกปลาหมอ (Acanthus sp.)	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
ยวนแหล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพยามเขาสก
ยางน่อง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง
ยางมันหมู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-ทะเลบัน
ยางแรด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ยางวาด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ย่าน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ย่านอวดน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

ย่านาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ร็อก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
รองเท้านารีดอกขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
รองเท้านารีเหลืองกร	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
ระย้าหยก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
รักทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
รักป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
รังไก่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
รังเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
รามใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
เร่วคง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ล่อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น-น้ำตกสี่ขีด
ละมุดป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ลักเคยลักเกลือ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ลั้งคั่ว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ลำเจียก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ-ตะรุเตา-หมู่เกาะสุรินทร์
ลำเต็ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ลำบิดทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ลำพู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ลำเพ็ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง-อ่าวพังงา
ลำแพน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
ลำแพนเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม
ลำแพนทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ลำแพนหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ลั่นกวาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-หมู่เกาะสุรินทร์
ลั่นควาย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ลั่นแรด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ลิเภาใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
เลือดควาง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
เลือดนก	พบในพื้นที่อุทยานเขาน้ำตกโยง

เลือดแรด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
วา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ว่านกีบแรด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ว่านงคดิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ว่านพังพอน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ศรีตรัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
สตอด้กแดน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
สไบสีดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
สั้มกบ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
สมอทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
สยา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี-ทะเลบัน-น้ำตกทรายขาว - บุญโค-สุโงปาดิ
สยาขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง-เขาหลวง
สยาแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
สลดคป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
สลดไคป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
สตอป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา-ศรีพังงา
สะเดียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง
สะยา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
สังเกียด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
สังวาลย์โนรี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
สังหยู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
สาकु	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-อ่าวมะนาว-เขาดันหยง
सानขน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
สาวดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
สาหร่ายทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
สาหร่ายสีเขียว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
สาหร่ายสีแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
สาหร่ายสีน้ำตาล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
สาหร่ายเห็ดหูหนู	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

สิงโตพัดเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
สิงโตอาจารย์เต็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
สุเหรียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
เสม็ดขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง-ตะรุเตา
เสม็ดขุน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-ทะเลบัน
เสม็ดแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
เสียดค้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม
เสียดช่อ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
เสมขาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
เสมดำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
แสงพันเถา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โศกเหลือง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง
ไต้ปลาไหล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หงอกค้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-หมู่เกาะสุรินทร์
หงอนไก่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม
หงอนไก่ทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ลำน้ำกระบือ-หมู่เกาะสิมิลัน
หญ้ากุ่มชายฝั่ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
หญ้าข้าวป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หญ้าขุย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
หญ้าเข็ม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หญ้าคาทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
หญ้าเงาแคระ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
หญ้าเงาหรืออำพัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
หญ้าชะเงา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
หญ้าชะเงาแคระ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
(<i>Harophila beccarii</i>)	
หญ้าชะเงาเต่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
หญ้าชะเงาใบยาว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ-หาดเจ้าไหม
หญ้าชะเงาใบสั้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
หญ้าชะเงาใบสั้น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน-หมู่เกาะพยาม-หาดเจ้าไหม

ปล้องยาว

หญ้าชะเงาใบสั้นสีเขียว

หญ้าชะเงาใบสั้นสี

น้ำตาล

หญ้าเต่า

หญ้าทะเล

หญ้าใบมะกรูด

หญ้าใบมะขาม

หญ้าใบสน

หญ้าปริก

หญ้าผมนาง

หญ้ามะกรูดใบเล็ก

หญ้ามะกรูดใบใหญ่

หญ้าชายเขา

หญ้าสามคม

หญ้าหนูตัน

หญ้าหวาย

หญ้าหางนกยูง

หญ้าไหวทาม

หนาดใหญ่

หนามแท่ง

หมากเจ

หมากแดง

หมากเทา

หมากผู้หมากเมีย

หมากพน

หมากพระราหู

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หาดนพรัตน์ธารา

หมู่เกาะพีพี-หมู่เกาะพยาม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-อ่าวพังงา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-หาดเจ้าไหม

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะพยาม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หาดนพรัตน์ธารา

หมู่เกาะพีพี-หมู่เกาะพยาม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-เขาปู่-เขาย่า

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก

หมากอาดัง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หมายนา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
หมูหมั่น	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
หิยทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
หิยน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง-อ่าวมะนาว-เขาคันทรง
หลงไหล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
หลุมพอ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
หลุมพอทะเล	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-ตะรุเตา
หัวน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
หอยจีไก่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
หอยจีเสียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด -ได้ร่มเย็น
หอยเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง-น้ำตกสี่ขีด
หอยงวย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
หอยชะโอนเขา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
หอยแซ่ม้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
หอยเคา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
หอยเคาใหญ่	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
หอยแดง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น-หมู่เกาะพยาม
หอยตะค้าทอง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี -เกาะลันตา
หอยเทิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
หอยปูเจ้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
หอยผึ้ง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
หอยไม้เท้า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
หอยเส้มี	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น-น้ำตกสี่ขีด
หอยหอม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
หอยเหิง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
หันช้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่-หมู่เกาะสุรินทร์
หัวกา	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
หัวค้าง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
หัวเต่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

หัว้ายเปิด	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
เหงือกปลาหมอดอก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-ลำน้ำกระบรี
ม่วง	
เหรียญ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้
แหลม	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม
ไหม้	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อ้ายบัว	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง-หมู่เกาะสุรินทร์
อินทนิลน้ำ	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
เอ็นอ้าน้อย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เอียน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
เอื้องคีรีวง	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
เอื้องแดงหิน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
เอื้องป่า	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
เอื้องฝ้ายหอย	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
เอื้องสายเสริตสัน	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
เอ็ก	พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

กระบาก หรือ กะบาก	ตะแบก	มอส
กล้วยไม้	ตาเสือ	มะกล่ำต้น
กล้วยไม้ดิน	ตีนนก	มะกอก
ก่อ	เต้าร้าง	มะไฟ
ก่อเดือย	ปออีแก้ง	มะม่วงป่า
ชำ	ปาล์ม	โมกมัน
ชิง	เป้ง	ยมหอม
คอแลน	ไผ่	ยมหิน
เคี่ยมคะนอง	ไผ่ป่า	ขยป่า
จิวป่า	ไผ่ไร่	ยาง
จำปาป่า	พญาไม้	ยางแดง
ชายผ้าสีดา	พะยอม	ยางนา

แดง	พะวา	ยางปาย
ตะเคียน	เฟิร์น	สมพง
ตะเคียนทอง	เฟิร์นก้านดำ	สัตบรรณหรือ สัตตบรรณ
ตะเคียนหิน	เฟิร์นก้านดำ	ส้าน
หญ้า	หญ้าคา	หว่า
หวาย	เหมือด	เอื้องหมายนา

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

ยกเว้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ

แก้มขาว	เคย	มะเเฒ่า
ขนุนป่า	นนทรี	ยางขน
ข่อยหนาม	เปราะ	ยางเสี้ยน หรือ ยางเสียน
เจียงพรา้งนางแอ		

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

ยกเว้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก

กล้วยไม้ป่า	เหียด	ไม้ไผ่
ก้ามกุ้ง	เถาวัลย์	ว่าน
กุศ	พยอม	สมุนไพรร
ขาคม	ไม้เถา	สอยดาว
ข้าป่า	จิก	สะตอ
ขุนไม้		

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค

ยกเว้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก่อนก	บอน	มะลั่น
ก่อแป้น	บุก	เร่ว
กำยาน	บุณฑาค	ส้มเสี้ยว
เกล็ดนาคราช	เปราะป่า	สะทิบ
ข้าหลวงหลังลาย	เปล้า	สะบ้า

แหม	ผักกูด	สาบเสือ
ชมพู่ป่า	ผักหนาม	เลี้ยวเครือ
ดินเป็ด	ผักหวาน	หญ้าคมบาง
แต้ว	ผ่าเลี่ยน	หวายขม
มะกอกป่า	พระเจ้าห้าพระองค์	อบเชย
มะไฟป่า	พลับพลา	อินทนิล

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค ยกเว้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้

กระเจียว	แคทราย	ปรัง
กระโดน	จำปีป่า	ปรังป่า
กระบก หรือ กะบก	ชิงชัน	ประดู่
กระเบากลัก	ซ้อ	ประดู่ป่า
กราด	ตะคร้อ	เปล้าหลวง
กล้วยป่า	ตะคร้ำ	ไผ่ข้าวหลาม
กลอย	ตะเคียนหนู	ไผ่ซาง
กว้าว	ตะแบกเปลือกบาง	ไผ่รวก
กอน้ำ	ตะแบกเลือด	พลวง
ก่อแพะ	ตะแบกใหญ่	พะอง
กะดังใบ	ติ้ว	มะกอกเกลื้อน
เข็มขาว	เต็ง	มะเกลือ
มะขามป้อมดง	ทะโล้	มะขามป้อม
มะค่าแต้	มะหาด	รัง
มะค่าโมง	รกฟ้า	ลำพูป่า
มะแฟน	รัก	สนสองใบ
สนสามพันปี	สมอพิเภก	เสลา
สมอ	สาธร	แสมสาร

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระเจียวขาว	ตองกง	แววมยุรา
-------------	-------	----------

กระดุมเงิน	ตัวขน	สมอไทย
กระมอบ	ตัวแดง	สายหยุด
ก่วมแดง	พง	สารภีคอย
ก่อเตี้ย	พะยุง	หนอนตายหยาก
ก่อรัก	ฟองหิน	เอื้องคำ
กัคลิ้น	เม้าแดง	เอื้องคำหิน
กุหลาบขาว	ไม้ก่อ	เอื้องแปรงสีฟัน
กุหลาบแดง	รองเท้าตะนารี หรือรองเท้า นารี	เอื้องผึ้ง
คุลีตา	เลา	ม้าวิ่ง
เคื่อหูกวาง	ไถเคน	

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของภาคเหนือ และภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก

กระชายป่า	กูดพร้าว	นมตำเลีย
กระชายป่า	เก็ดแดง	นมแมว
กระดุกไก่อ	จะเจ้ายะ	ปอ
กระดุกค่าง	จี้อย	เป้งคอย
กระแตไต่ไม้	โจด	เปล้าใหญ่
กระทือ	ชมพูน้	ไผ่ชางนวล
กระทุ่ม	ชะมวง	ไผ่บง
กระพีเข้าควาย	คำดง	ไผ่เพ็ก
กระพีจั่น	ดีหมี	ไผ่หก
กระวาน	โคไม่รู้ล้ม	ไผ่หนาม
กฤษณา	ตะก้อ	ไผ่หอบ
กาวเครือ	ตะแบกแดง	ไผ่เหี้ยะ
กางขี้มอด	ดาว	มณฑาป่า
กาสามปีก	ตำว	มะก่อ
กำลังเสือโคร่ง	ตุ้มเต็น	มะเก็ม
มะม่วงหาวแมลงวัน	เล็บเหยี่ยว	มะเคื่อ
เมื่อย	สะแกเครือ	แสลงใจ

โมกหลวง	สบ้าลิง	หญ้าน
ยางขาว	สัก	หนามคนทา
ย่านลิเภา	สารภีป่า	หนามเล็บเหยี่ยว
รักใหญ่	เสี้ยว	หัสคุณ
เอื้องกุหลาบพวง	เสี้ยวป่า	เหมือดคน
อุโลก	เครือออน	อ้อ

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของภาคเหนือ และภาคใต้

ก่อตาหมู	เต่าร้างยักษ์	ไม้เลื้อย
กะทัง	เต้าหลวง	เลื้อดม้า
กุหลาบพันปี	ถั่ว	ว่านสากเหล็ก
กุคขน	พลอง	สะท้อนรอก
ค้อ	เพกา	ล้านใหญ่
แคหิน	โพบาย	หมามุ่ย
ตะแบกนา	มะพร้าววนกลุ่ม	หว่านิน
ดั่งหน	มะเฒ่าสาย	เอื้อง

พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระจับเขา	นนทรีป่า	ลูกใต้ใบ
กระดุกอึ้ง	นมวัว	เลี่ยน
กระไคลิง	ผักปราบ	สังกรณี
ก่อต่าง	มะค่า	สาหร่ายข้าวเหนียว
เขลียง หรือ เขลง	ไม้หนาม	ลำโรง
แคหางค่าง	ยางกล่อง	หญ้าขจรจบ
จิกดง	ลาน	หญ้าข้าวก่ำ


พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคใต้

กะป้อ	ด้วขาว	พังกาหัวสุ่ม
กันเกรา	ดินเป็ดทะเล	โพทะเล
เกด	เคยทะเลหรือลำเจียก	มหาสะดำ หรือมหาสดำ


โก่งกางใบเล็ก	เตยย่าน	มะนาวผี
โก่งกางใบใหญ่	ถั่วขาว	มะพลับ
ขลุ่	ถั่วดำ	เมา
ข่อย	ทำม้ง	เมา
เข็มป่า	ไทร	ยางชุม
คอหือ	นกกอน	ชุม
เคี่ยม	เนียง	ระกำ
เคยอดคำ	ปอทะเล	ลำป้าง
จั่ว	โปรงขาว	เลื้อยควาย
จันทน์ผา	โปรงแดง	สนทะเล
จาก	ผักนึ่งทะเล	สลัดไค
ช้องแมว	ไผ่ผาก	สะเดาปีก
ตะโก	ฝาดดอกแดง	สารภีทะเล
ตะบัน	พญาเท้าเอว	ลำมะงา
ตะบูน	พลับดง	เสม็ด
ตะบูนดำ	หมากเขียว	แสม
ตังหนใบใหญ่	หมากนางลิง	แสมทะเล
ตาคุ่มทะเล	หลาวชะโอน	โสกน้ำ
ตาเปิดตาไก่	หว่าเขา	หมาก
หวายลิง	หวายกำพวน	หูกวาง
หวายเล็ก	หวายขริง	

สื่อการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา

การศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา เช่น ต้องการทราบข้อมูลอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สามารถดับเบิลคลิกที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง



ภาพที่ 22 ตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง




ภาพที่ 23 แสดงรายละเอียดของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกเพื่อลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ



ภาพที่ 24 เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ(อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)


นอกจากนี้สามารถดูข้อมูลสัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่น่าสนใจได้ เช่น ต้องการทราบข้อมูลสัตว์ป่า คือนกนางแอ่นตะโพกแดง และพันธุ์พืช คือ อินทนิล สามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูรายละเอียดได้



ดับเบิ้ลคลิกที่นกนางแอ่นตะโพกแดง

ดับเบิ้ลคลิกที่อินทนิล

ภาพที่ 25 แสดงการดับเบิ้ลคลิกเพื่อลิงค์ดูข้อมูลสัตว์ป่า และพันธุ์พืช



ภาพที่ 26 แสดงข้อมูลของสัตว์ป่า(นกนางแอ่นตะโพกแดง)



ภาพที่ 27 แสดงข้อมูลของพันธุ์พืช(อินทนิล)

วิจารณ์

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information System; GIS) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งทำการศึกษาถึงตำแหน่งพิกัดที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย การสืบค้นข้อมูลบางส่วนสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ต่างๆ และหนังสือแผนที่ของประเทศไทย สำหรับส่วนที่ไม่สามารถหาพิกัดของอุทยานแห่งชาติได้ใช้วิธีค้นหาพิกัดจากการนำที่อยู่ของอุทยานแห่งชาติไปสืบค้นโดยเว็บไซต์ของกรมแผนที่ทหาร (Digital Thailand) จึงทำให้บางอุทยานแห่งชาติไม่ได้พิกัดที่แท้จริงของอุทยานแห่งชาตินั้น แต่จะได้พิกัดที่ใกล้เคียง เช่น พิกัดของตำบลหรือ อำเภอ ตามที่อยู่ของอุทยานแห่งชาตินั้น ส่วนข้อมูลทางด้านอื่น ก็ได้ ข้อมูลในส่วนของคุณลักษณะของอุทยานแห่งชาติ พันธุ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แหล่งที่มาได้มาจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ และนิตยสารการท่องเที่ยวต่างๆ ข้อมูลที่ได้นั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจทราบได้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบันมากเท่าไร เช่นตามข้อมูลที่ได้อาจจะพบพะยูนในอุทยานแห่งชาติ แต่ปัจจุบันอาจไม่พบแล้ว และในบางครั้งสัตว์ป่าหรือ พันธุ์พืชบางชนิดก็เป็นพันธุ์ที่แปลก ชื่อไม่คุ้นทำให้มองภาพสัตว์ป่าหรือพันธุ์พืชชนิดนั้นไม่ได้ จึงทำลิงค์ข้อมูลของพันธุ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแต่ละชนิด ในส่วนนี้บางชนิดอาจมีเฉพาะรูปภาพ บางชนิดอาจมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเข้ามา โดยลิงค์ไปที่เว็บไซต์ต่างๆ เมื่อทำการนำเข้าข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ถึงขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากในด้านค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกูเกิลเอิร์ธได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ควรที่จะใช้กับระบบเน็ตเวิร์กที่มีความเร็วสูงเพื่อสะดวกแก่การทำงาน และทำให้เห็นรายละเอียดของพื้นที่ต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลก็จะถูกเก็บได้ในโปรแกรม แต่หากทำการบันทึกเป็นไฟล์ *.kmz แล้ว การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลทำได้ยาก และต้องใช้เวลาานาน หลังบันทึกไฟล์เป็น *.kmz เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนอัปโหลดไฟล์ลงเว็บไซต์ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวปิดให้บริการแล้ว สำหรับทางด้านสื่อการศึกษาเรียนรู้เป็นการประยุกต์เพื่อให้นักศึกษามองเห็นภาพรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน มากกว่าที่จะศึกษาแบบเป็นตัวอักษร ไม่มีภาพประกอบ ทำให้สามารถจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดีขึ้น เกิดความเพลิดเพลินในการศึกษา แต่การเปิดโปรแกรมจะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง

สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา ภายในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยมาวิเคราะห์ โดยนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งการศึกษาในที่นี้เป็นการสำรวจพันธุ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาได้แสดงผลออกมาเป็นแบบจำลองพื้นที่ นำเสนอผ่านผืนโปรแกรม Google Earth นอกจากเป็นโปรแกรมที่แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของสถานที่ต่าง ๆ บนโลก และยังแสดงภาพความละเอียดสูง ซึ่งถ่ายจากมุมสูงเหนือชั้นบรรยากาศโดยผลจากการสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั้น สามารถนำมาจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สาขา นิเวศวิทยา ซึ่งเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ

จากการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของประเทศไทยทั้งหมด 148 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ 59 แห่ง อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวมกัน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แห่ง และอุทยานแห่งชาติในภาคใต้ 40 แห่ง โดยข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งหมดที่พบในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ประมาณ 1321 ชนิด และข้อมูลพันธุ์พืชทั้งหมดที่พบในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยประมาณ 1451 ชนิด โดยแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้

1. ข้อมูลที่นำมาศึกษาพบว่าพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค จำนวน 117 ชนิด และพบพันธุ์พืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของทุกภาค จำนวน 55 ชนิด

2. ในส่วนข้อมูลที่นำมาศึกษาพบว่าพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ แต่ไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 180 ชนิด แต่ไม่พบพันธุ์สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ขึ้นไป และพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่พบในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ จำนวน 13 ชนิด

ด้านพันธุ์พืชที่พบในอุทยานแห่งชาติในภาคเหนือแต่ไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 349 ชนิด พบพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ขึ้นไป จำนวน 1 ชนิด และพันธุ์พืชที่ไม่พบในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ จำนวน 10 ชนิด

3. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก แต่ไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 178 ชนิด พบพันธุ์สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 4 แห่ง ขึ้นไป จำนวน 3 ชนิด และพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่พบในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก จำนวน 19 ชนิด

ด้านจำนวนพันธุ์พืชที่พบในอุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก แต่ไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 162 ชนิด แต่ไม่พบพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 4 แห่ง ขึ้นไป และพันธุ์พืชที่ไม่พบในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก จำนวน 16 ชนิด

4. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 73 ชนิด แต่ไม่พบพันธุ์สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ขึ้นไป และพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่พบในอุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 ชนิด

ด้านจำนวนพันธุ์พืชที่พบในอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 136 ชนิด แต่ไม่พบพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ขึ้นไป และพันธุ์พืชที่ไม่พบในอุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 33 ชนิด

5. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาคใต้ แต่ไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 452 ชนิด พบพันธุ์สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ 4 แห่ง ขึ้นไป จำนวน 21 ชนิด และพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่พบในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ 35 ชนิด

ด้านจำนวนพันธุ์พืชที่พบในอุทยานแห่งชาติในภาคใต้ แต่ไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 379 ชนิด พบพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ 4 แห่ง ขึ้นไป จำนวน 28 ชนิด และพันธุ์พืชที่ไม่พบในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ จำนวน 57 ชนิด

6. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก จำนวน 47 ชนิด

ด้านข้อมูลพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก จำนวน 68 ชนิด

7. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 27 ชนิด

ด้านข้อมูลพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 32 ชนิด

8. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 32 ชนิด

ด้านข้อมูลพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 24 ชนิด

9. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 ชนิด

ด้านข้อมูลพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 ชนิด

10. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และ ภาคใต้ จำนวน 84 ชนิด

ด้านข้อมูลพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และ ภาคใต้ จำนวน 72 ชนิด

11. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 19 ชนิด

ด้านข้อมูลพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 5 ชนิด

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

ชัยศิลป์ พนาวิวรรณ. 2548. คู่มือ **Google Earth** ฉบับสมบูรณ์. โปรวิชั่น จำกัด. กรุงเทพฯ.

ธนะบูล แจ่มกระจ่าง. 2550. Trips this Month:Northern National parks. นิตยสาร **Trips MAGAZINE 11(132)**:1-174.

ธนะบูล แจ่มกระจ่าง. 2550. Trips this Month:North Eastern National parks. นิตยสาร **Trips MAGAZINE 12(133)**:1-175.

ธนะบูล แจ่มกระจ่าง. 2550. Trips this Month:Central Eastern andWestern National parks
นิตยสาร **Trips MAGAZINE 12(134)**:1-180.

ธนะบูล แจ่มกระจ่าง. 2550. Trips this Month:Southern National parks. นิตยสาร **Trips MAGAZINE 12(135)**:1-179.

นิรนาม. 2550. อุทยานแห่งชาติ. วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรีแหล่งที่มา:<http://th.wikipedia.org>.
11 มิถุนายน 2550.

บริษัท ESRI (Thailand) จำกัดและคณะ. 2548. แผนที่ทางหลวง **ESRI(Thailand)** เพื่อการเดินทาง
และท่องเที่ยว ปี **2549**.

วรเดช จันทรศร และสมบัติ อยู่เมือง . 2545. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหาร
ภาครัฐ . ม.ป.ท., กรุงเทพฯ. 181 น.

วรพจน์ พรหมสัตยพรต. 2546. “GIS กับงานสุขภาพ”. หมออนามัย 13(1) : 28-32.

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย. 2542. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS). **Geo-InformaticS Center for Thailand (GISTHAI)** แหล่งที่มา:<http://www.gisthai.org/>. 6 พฤษภาคม 2550.

สรรค์ใจ กลิ่นดาว. 2542. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: หลักการเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. ม.ป.ท, กรุงเทพฯ.

สุเพชร จิรขจรกุล. (2544). เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย **PC AREVIEW**. ม.ป.ท, กรุงเทพฯ.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2548. การประยุกต์ใช้ ข้อมูลสารสนเทศ. **ความรู้ด้านวิชาการ**. แหล่งที่มา:<http://www.gistda.or.th>. 22 พฤษภาคม 2550.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. 2549. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข แหล่งที่มา:http://province.moph.go.th/nakhonratchasima/gis_koratpage.htm, 25 กันยายน 2550.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2545. สารสนเทศภูมิศาสตร์. สารสนเทศภูมิศาสตร์ **GAT 2545**. แหล่งที่มา:<http://www.moe.go.th/webbpps/Achi2545/GAT2545/AchievePage.htm>, 7 กรกฎาคม 2550.

ประวัติการศึกษา

1. นางสาวพรณิศา สัตยารัฐ

2. ประวัติการศึกษา

2.1 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น (พ.ศ. 2540)

2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น (พ.ศ. 2543)

2.3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น (พ.ศ. 2546)